

แมนิดิพิน  
ความแรง 20 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด  
ชื่อการค้า MANIDIP (มานิดิพ)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า แมนิดิพินไฮโดรคลอไรด์ (manidipine hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มควบคุมโรคความดันเลือดสูง

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อควบคุมโรคความดันเลือดสูง และโรคความดันเลือดสูงที่มีภาวะไตบกพร่องร่วมด้วย

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มไดไฮโดรไพริดีน
- X** เมื่อตั้งท้องหรือวางแผนว่าจะตั้งท้อง
- X** เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หากท่านมีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
  - การหยุดใช้ยาแมนิดิพินเองโดยทันทีอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น หากมีความจำเป็นต้องหยุดใช้ยาแมนิดิพินควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
  - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรืออาจเกิดอันตรายได้ เช่น ยาดีจ็อกซิน มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเดียวกันกับแมนิดิพิน ยาไซเมทิดีนทำให้ปริมาณยาในกลุ่มเดียวกันกับยาแมนิดิพินสูงขึ้น เมื่อใช้ร่วมกัน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละครั้งหลังอาหารเช้า

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หน้ามืด เวียนหัว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากความดันเลือดลดต่ำมาก หรือเกิดอาการเวียนศีรษะ ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร
- ระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้เวียนหัว
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- หน้าแดงร้อน ร้อนตามตัว เยื่อบุตาบวม ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น
- มีนงง เวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงนอนมาก ผิดปกติ หรือขาดตามร่างกาย
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาการมวนท้อง เสียดท้อง แสบยอดอก ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ปากแห้ง
- อ่อนเพลีย บวมตามแขนขา บัสสาวะบ่อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาเม็ดกลม แบบ สีเหลืองอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งเม็ดทั้งสองด้าน
- ตัวยาสำคัญ แมนิดิพินไฮโดรคลอไรด์ 20 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ เบต้าไซโคลเดกซ์ทรีน (Betacyclodextrin), แลคโตสโมโนไฮเดรต (Lactose monohydrate), คอร์นสตาร์ช (Corn starch), โปวีโดนเค30 (Povidone K30), น้ำ (Purified water), โพลีเอทิลีนไกลคอล6000 (Polyethylene glycol 6000), เหล็กออกไซด์ (Yellow iron oxide), โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (Sodium starch glycolate), คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ (Colloidal silicon dioxide), แมกนีเซียมสเตียเรต (Magnesium stearate)

ผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด ประเทศไทย  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธันวาคม 2563