

เพกาสปาร์เกส

ความแรง 750 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Oncaspar (ออนแคสปาร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เพกาสปาร์เกส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโฟบลาสต์แบบเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง
18 ปีและผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับชนิดรุนแรง
- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยมีภาวะตับอ่อนอักเสบ
- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยมีภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงจากการรักษา
ด้วยยาแอสพาราจินาส
- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรักษาด้วย
ยาแอสพาราจินาส

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เคยแพ้ยาแอสพาราจินาสรูปแบบอื่น
 - มีเลือดออกผิดปกติ หรือมีลิ่มเลือดอุดตัน
 - มีไข้
 - มีการทำงานของตับหรือตับอ่อนไม่ดี
 - มีอาการปวดท้องรุนแรง
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะมีลูก
 - กำลังให้นมลูก
 - ใช้ยากุมกำเนิดอยู่
 - เพิ่งได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นไม่เกิน 3 เดือน
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ให้โดยการฉีด
- ยานี้ต้องให้โดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทาง
การแพทย์เท่านั้น

3.2 หากลิ่มมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ควรรีบติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าท่านได้รับยาเกินขนาดให้รีบแจ้งแพทย์
พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นที่
ไม่ใช่การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด ตลอดระยะเวลาการ
รักษาและต้องคุมกำเนิดต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน
หลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้ชายต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเมื่อรักษา
ด้วยยานี้ หรือเมื่อคุณอนใช้ยานี้ และต้องคุมกำเนิด
ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกตลอด
ระยะเวลาการรักษา
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจาก
ที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้หิวขี้ม สับสน เวียนศีรษะ
เป็นลมหมดสติ หรือชักได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือ
เลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้องอย่างรุนแรงจนอาจร้าวถึงหลัง และอาเจียน
- หายใจสั้น ใจสั่นหรือเต้นเร็ว
- ชักและหมดสติ
- มีไข้สูง
- สีผิว สีปัสสาวะ หรือสีอุจจาระเปลี่ยนไป
- ปริมาณเบีสสาวะผิดปกติ เหน็บและข้อเท้าบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องบวม
- มีไข้ หรือมีอาการคล้ายไข้
- เจ็บปาก น้ำหนักลด ไม่อยากอาหาร อ่อนแรง
- คลื่นไส้ ท้องเสีย
- ปวดหลังหรือข้อกระดูก
- ปวดแขนหรือขา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น
- เก็บยานีไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นผงยาสีขาวถึงขาวนวล บรรจุขวดแก้วไวแอล ปิดด้วยจุกยาง
- **ตัวยาสำคัญ** เพกาสปาร์เกส
- **ส่วนประกอบอื่นๆ**
ไตรโซเดียมฟอสเฟตเฮปตาไฮเดรต,
โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต,
โซเดียมคลอไรด์, ซูโครส, โซเดียมไฮดรอกไซด์,
กรดไฮโดรคลอริก

ผู้ผลิต ไลโอไฟไลเซชั่น เซอร์วิส ออฟ นิวอิงแลนด์,
สหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**