

เมโทรนิดาโซล

ความแรง 65 มิลลิกรัมต่อเจล 5 กรัม
ชนิด เจลสำหรับใช้ทางช่องคลอด
ชื่อการค้า NUVESSA (นิวเวสซา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) มีตัวยา 65 มิลลิกรัมต่อเจล 5 กรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ในผู้หญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ผู้ที่กำลังใช้หรือหยุดไม่ถึง 2 สัปดาห์ ในยาหยุดเห็บ (ยาไดซัลฟีแรม)
- ⊗ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากหยุดใช้ยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้


- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีหรือเคยมีโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง
 - ตั้งท้องหรือวางแผนตั้งท้อง
 - อยู่ระหว่างให้นมลูก หรือมีแผนจะให้นมลูก
 - กำลังใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ผ้าอนามัยแบบสอด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้กับช่องคลอด
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาครั้งเดียวตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับสอดทางช่องคลอดเท่านั้น
- ไม่แนะนำให้ใช้ยาในช่วงที่มีประจำเดือน

- วิธีใช้เจลสอดทางช่องคลอด ดังต่อไปนี้
 1. แกะซองออก ดึงแท่งเจลและก้านสอดออกจากซอง
 2. สอดก้านสอดลงในแท่งเจลด้านที่ไม่มีฝาปิดและกดลงจนสุด
 3. ดึงฝาสีชมพูออก โดยดึงขึ้นทางตรง
 4. นอนหงายหรือนั่งเอนตัวไปด้านหลัง งอเข่าขึ้นมาทางหน้าอกและแยกขาออก
 5. สอดแท่งเจลเข้าช่องคลอด โดยค่อยๆใช้นิ้วกดก้านสอดลงช้าๆ เพื่อให้เจลผ่านเข้าไปในช่องคลอด
 6. ดึงแท่งเจลออกจากช่องคลอด



รูปแสดงวิธีการสอดหลอดยาเข้าช่องคลอด

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ยานี้ใช้ครั้งเดียว

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ยานี้ใช้ครั้งเดียวตามปริมาณที่บรรจุในหลอด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- -

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว คลื่นไส้ ท้องเสีย

- ปวดประจำเดือน เจ็บช่องคลอด
- คัน ระคายเคืองช่องคลอด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามแช่เย็น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เจลสีเหลืองอ่อน บรรจุในหลอดยาว
 - ตัวยาสัญญา เมโทรนิดาโซล
 - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Benzyl alcohol (เบนซิลแอลกอฮอล์) Methylparaben (เมทิลพาราเบน) Polycarbophil (โพลีคาร์โบฟิล) Polyethylene glycol 400 (โพลีเอทิลีนไกลคอล 400) Propylene glycol (โพรพิลีนไกลคอล) Propylparaben (โพรพิลพาราเบน) Water (น้ำ)
- ผู้ผลิต Laboratorios Liconsa, S.A., Guadalajara, Spain
ผู้นำเข้า บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน พ.ศ.2565
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)
▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร