

Package Leaflet
Thailand

มอนเทลูคาสต์ ความแรง 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า Montek Teva (มอนเท็ค เทวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า มอนเทลูคาสต์ (Montelukast)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อเป็นยาเสริมการรักษาโรคหอบหืด รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบหืดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
- ใช้ป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากการออกกำลังกาย
- ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ไม่ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
 - มีอาการต่อไปนี้ร่วมกัน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เหน็บชา แขนขาชา การทำงานของปอดแยลง ผื่นขึ้น
 - กินยาแอสไพริน หรือยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เพราะยาเหล่านี้อาจทำให้อาการหอบหืดแยลง
- อายุต่ำกว่า 15 ปี
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาทั่วไปที่แนะนำ: ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ได้แก่ ปวดท้อง ง่วงนอน กระจายน้ำ ปวดหัว อาเจียน กระตือรือร้นผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ห้ามหยุดยาเองถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรค
- ควรกินยารักษาอาการหอบหืดทั้งหมดที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากยานี้ไม่สามารถใช้ทดแทนยาชนิดอื่นที่รักษาอาการหอบหืดได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลข้างเคียงจากยา
- ควรพกยาอื่นที่ใส่แค้จับหืดเฉียบพลันติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะยานี้ไม่ใช่ยาบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน
- ยานี้อาจทำให้วังงซึมได้ในผู้ป่วยบางราย ควรระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- พฤติกรรม หรืออารมณ์เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมก้าวร้าว ภาวะซึมเศร้า อาการชัก มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่如果有อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ใช้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เนื่องจากติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
- ปวดหัว เวียนหัว
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นขึ้น

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่如果有อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่ให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปกลม สีเบจ ด้านหนึ่งมีตัวเลข '93' อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข '7426'
- ตัวยาสำคัญ มอนเทลูคาสต์
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โซเดียม ลอริลซัลเฟต, แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส, สตาร์ชพรีเจลาตินอส, โซเดียม สตาร์ชไกลโคเลท

แพคเกจ
Packaging
Learn
แพคเกจ
แพคเกจ
แพคเกจ
แพคเกจ

ทีบ์เอ, แมกนีเซียมสเตเดียมเรต, ไฮดรอกซีโพรพิล
ซัลโฟโลส, ไฮโปรเมลโลส, โททาเนียมไดออกไซด์
(อี171), ไอออนออกไซด์ สีเหลือง (อี172), ไอออน
ออกไซด์ สีแดง (อี172)

ผู้ผลิต: Teva Operations Poland Sp. z o.o.,
Kraków, Poland

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร