

# ดีไซทาบิน

## ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อขวด

### ชนิดผงสำหรับฉีด

#### ชื่อการค้า Decinjet (ดีซินเจ็ท)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ดีไซทาบิน (Decitabine)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องใช้นานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- กำลังให้นมลูก

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีไข้
  - เป็นโรคตับ
  - เป็นโรคไตขั้นรุนแรง
  - เป็นโรคหัวใจ
  - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
  - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  - ผู้ป่วยชายที่วางแผนจะมีลูก

## 3. วิธีการใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับสภาพร่างกายและการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย และความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ โดยวิธีหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

### 3.2 หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร

ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

### 3.3 หากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้นานี้
- ผู้หญิงให้คุมกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากหยุดยา
- ผู้ชายให้คุมกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากหยุดยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาลทันที ได้แก่

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้
- เจ็บหน้าอก หายใจถี่
- เคลื่อนไหวลำบาก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดหัวรุนแรงเจ็บพลัน ชัก ชาครึ่งซีก
- อุจจาระมีสีดำ
- บัสสาวะน้อยลง ความดันต่ำ บวมตามแขนหรือขา
- น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว
- ปวดท้อง ท้องอืด ถ่ายเหลว ร่วมกับมีไข้

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

**ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาล

- บัสสาวะบ่อย ปวดแสบ ชัด เวลาบัสสาวะ
- ชีต อ่อนเพลีย
- เลือดออกง่าย เลือดกำเดาไหล
- คลื่นไส้ อาเจียน
- มีน้ำมูก ปวดแสบโพรงจมูก
- มีแผลที่ปากหรือลิ้น

**“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง บรรจุในขวดแก้วใส สำหรับเตรียมเป็นสารละลาย และเจือจางเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
- **ตัวยาสาคัญ** ดีไซทาบิน 50 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** โปแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โซเดียมไฮดรอกไซด์ อะซีโตนไทรโกลีเซอไรด์คลอริก น้ำสำหรับฉีด ไนโตรเจน

**ผู้ผลิต:** Eugia Pharma Specialities Limited, India

**ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:**

บริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย เลขที่ 438

ซอยพัฒนาการ 30 ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2566

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**