

โรฟาซิมิน**ความแรง 550 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม****ชื่อการค้า RISAVIE 550 (โรฟาวี 550)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อว่า โรฟาซิมิน (rifaximin)
เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มโรฟามัยซิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคสมองเหตุจากโรคตับในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มโรฟามัยซิน เช่น ยาไรแฟมพิซิน ยาไรฟาบูติน
- มีภาวะลำไส้อุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 - เป็นผู้ป่วยโรคตับ
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
 - กำลังให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาฆ่าเชื้อ ยาวาร์ฟาริน ยาแก้นชัก ยาคุมกำเนิด ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีการใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด **ห้ามบด** ตัด หรือเคี้ยวยา
- หลังจากกินยา ควรดื่มน้ำตามมากๆ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา**
- กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยาอาจทำให้มีมึนงง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- มีเลือดออกในลำคอ
- ท้องเสียอย่างรุนแรง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- บัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย น้ำตา เหนือ มีสีส้มแดง
- ง่วงซึม มีมึนงง ปวดหัว มีไข้เล็กน้อย
- เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- ไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นเม็ดเคลือบฟิล์มสีส้ม รูปแคบซูล เรียบทั้งสองด้าน
- ตัวยาสำคัญ** โรฟาซิมิน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่**
ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรตไฮดรอกไซด์, โพลีเอทิลีนไกลคอล, ไฮโปรมेलโลส, ไดโซเดียมอีดีทีเอ, ทาลคัม, คอลลอยด์ลแอนไฮดรัสซิลิกา, กลีเซอรอลพาล์มิโตสเตียเรต, แมกนีเซียมสเตียเรต, อินสตาค็อดเอสไอแอลไวท์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, อินสตาค็อดยูนิเวอร์แซลลอเรนจ์

ผู้ผลิต บริษัท อาร์วี ไลฟ์ไซน์ จำกัด, ประเทศอินเดีย
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2567

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร**