

เอนเทคคาเวียร์**ความแรง 0.5 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ดยาเคลือบฟิล์ม****ชื่อการค้า HEPURI F.C. TABLETS 0.5 mg
(เฮปูริ เอฟ.ซี. แท็บเล็ต 0.5 มก.)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า เอนเทคคาเวียร์ (entecavir) เป็นยาในกลุ่มยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ดื้อต่อยาลามิวูดีน
 - เป็นโรคตับหรือโรคไต
 - ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
 - เคยรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
 - แพ้น้ำตาลนม
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาก่อนหน้านี้มาก่อน สามารถกินยาพร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้
- สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาลามิวูดีนไม่ได้ผลและผู้ป่วยโรคตับขั้นรุนแรง ควรกินยาขณะท้องว่าง เช่น กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือ หลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไป ให้รอกินยาของมื้อถัดไปโดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเพราะการหยุดยาอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว เวียนหัว นอนไม่หลับ ง่วงซึม
 - คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องร่วง
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปสามเหลี่ยม สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวเลข 948 อีกด้านหนึ่งมีอักษร STD
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, ครอสโพลิดอน, แมกนีเซียมสเตียเรต, โซโพรมีโลส, โพลีเอทิลีน ไกคอล 4000, ทาลก์, ไททานเนียมไดออกไซด์

ผู้ผลิตSTANDARD CHEM. & PHARM. CO. LTD. 2nd Plant Taiwan.**ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย**

บริษัทยูเนี่ยนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx><http://ndi.fda.moph.go.th/>**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**