

ฟีนัยโตอินโซเดียม
ความแรง 50 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับฉีดหรือ
หยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Neutoin (นิวโตอิน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า นิว-โต-อิน (Neutoin) มีตัวยาคือ ฟีนัยโตอิน-โซเดียม เป็นยาในกลุ่มยาด้านอาการชัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ควบคุมอาการชัก และรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยแพ้ยากันชักชนิดอื่น
- ⊗ มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หรือมีความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจ
- ⊗ กำลังใช้ยา ดีลาเวอร์ดีน (delavirdine)

"หากท่านไม่แน่ใจว่าแพ้หรือมีภาวะดังกล่าวหรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร"

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - มีความดันโลหิตต่ำ หรือหัวใจล้มเหลว
 - เป็นโรคตับหรือโรคไต
 - เป็นโรคเบาหวาน
 - ตั้งท้อง สงสัยว่าท้อง หรือวางแผนจะมีลูก
 - ใช้นยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่เพราะอาจมีผลต่อการรักษา

- ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์
- ใต้บริรังสีรักษาที่ศีรษะ
- มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย
- เป็นโรคพอร์ไฟเรีย (โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการสร้างฮีโมโกลบิน)
- ไม่ควรใช้นานี้ในหญิงให้นมลูก

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าท่านไม่ได้รับยาตามปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

3.3 ถ้าหากได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้เวียนหัว และง่วงนอน
- ผู้ป่วยหญิงควรปรึกษาแพทย์เรื่องการคุมกำเนิดระหว่างใช้นานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดิบ
- ผิวหนังเปลี่ยนสี บวมหรือปวดบริเวณที่ฉีดแล้วกระจายไปยังแขน มือ นิ้วมือ
- รอยขีด มีไข้ อาการช็อค หรือมีอาการเจ็บคอรุนแรงต่อมในร่างกายนวม
- มีอาการปวดและอักเสบของข้อ
- สับสน พุดไม่ชัด มีอาการป่วยทางจิตรุนแรง
- การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ เช่น การเคลื่อนไหวของดวงตาผิดปกติ มีปัญหาการทรงตัวขณะยืน มีอาการสั่น เหยียดนิ้วมือให้ตรงลำบาก

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดบริเวณที่ฉีด
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ตัวบวม
- มึนงง ง่วงซึม เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ
- กระวนกระวาย กล้ามเนื้อกระตุก การรับรู้รสเปลี่ยนไป
- ริมฝีปากหรือเหงือกขยายใหญ่
- ขนที่ร่างกายหรือใบหน้าเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
- ผิวและตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้หลังวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากและบน กล่องยา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา นํ้ายาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส่ ไม่มีสี บรรจุในขวดแก้ว 5 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสำคัญ** ฟิแนยโดอินโซเดียม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โพลพิลีนไกลคอล เอทานอล กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และนํ้าสำหรับฉีด

ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 เมษายน 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับช้ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรมีสรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ใช้สตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารก พิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไต
5. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการ คล้ายเป็นหวัด ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
6. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
7. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่น แดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและ บริเวณเยื่อต่างๆ เช่น ในช่องปาก ลำคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อตาอักเสบ ให้หยุดยา และ ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome