

Patient Information leaflet (PIL)

**ลูบิพรอสโต่น 8 ไมโครกรัม
ลูบิพรอสโต่น 24 ไมโครกรัม
ชนิดแคปซูลนิ่ม
AMITIZA (อา-มี-ที-ชา)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอย่างไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลูบิพรอสโต่น (Lubiprostone) ชนิดสีชั้มพูมียา 8 ไมโครกรัม และชนิดสีส้มมียา 24 ไมโครกรัม เป็นยาในกลุ่มยา nhuận

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ชนิดสีส้มขนาด 24 ไมโครกรัม ใช้รักษาอาการห้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีแพทท์วินิจฉัยว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้
- ชนิดสีชัมพุขนาด 8 ไมโครกรัม ใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวนชนิดห้องผูกเด่นในสตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เด็กและเด็กต่ำวัย หรือส่วนประกอบของยา
- มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือสิ่งสกปรกในกระเพาะอาหาร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยาที่หากท่านมีอาการห้องเสียรุนแรง แพ้น้ำตาลบางชนิด ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะแพทย์ต้องวินิจฉัยสาเหตุของโรคเพื่อกำหนดขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา
- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยว บดหรือเปิดแคปซูล
 - กินยาพร้อมอาหารและดื่มน้ำตามเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่เกิดจากยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ในกรณีที่ลืม กินยาเมื่อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันที ถ้าทำได้ให้นำยาที่ดื่มตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พับแพทท์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษา
- ห้ามหยดยาลง และให้กินยาเมื่อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากใช้ยาแล้วปวดท้องมาก ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจภาวะอุดตันที่ทางเดินอาหาร
- แจ้งแพทย์หากมีอาการคลื่นไส้รุนแรงเมื่อใช้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรับไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปล็อกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แห่นหน้าอัก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ห้องเสียรุนแรง
- บุบหรือความดันเลือดต่ำ เมื่อกินยาครั้งแรกหรือหลังกินยาแล้วหลายครั้ง
- หายใจลำบากภายใน 1 ชั่วโมงที่กินยาครั้งแรก ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 3 ชั่วโมง และอาจเกิดข้ามเมื่อกินยาครั้งต่อไป

“ให้หยุดยาแล้วรับไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห้องอืด ห้องเฟ้อ ปวดท้อง ห้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีนง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยาเมื่อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยที่ไว้ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- แยกยาออกจากแพลงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ยานี้เป็นยาแคปซูลนิ่มรูปร่างยาวรี ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "SPI" พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ อีกด้านหนึ่งเรียบ ยานี้มีสองขนาดความแรง ชนิดสีส้มประกอบด้วยด้วยยา ลูบิพรอสโต่น 24 ไมโครกรัม และ ชนิดสีชัมพูประกอบด้วยตัวยาลูบิพรอสโต่น 8 ไมโครกรัม

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

ผู้ผลิต: Catalent Pharma Solutions, LLC, USA

ผู้นำเข้า: บริษัท ทาเคدا(ประเทศไทย)จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ตีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร