

**แพคลิแทกเซล**  
**ความแรง 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**  
**ชนิดสารละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Bravifo (บราวิวโฟ)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า แพคลิแทกเซล (Paclitaxel) เป็นยา  
รักษามะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา
- โรคมะเร็งรังไข่
- โรคมะเร็งเต้านม
- โรคมะเร็งปอด
- โรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา  
ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าคุณต้องใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ หญิงให้นมลูกเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง  
ต่อทารก
- ⊗ เม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดต่ำ (ตรวจโดยแพทย์)
- ⊗ ผู้ป่วยมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาที่คุมปริมาณเชื้อไม่ได้
- ⊗ เป็นโรคตับรุนแรง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร** ในกรณีต่อไปนี้
  - หญิงตั้งท้องให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจ  
มีอันตรายต่อทารกในท้องได้ แต่แพทย์อาจ  
พิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
  - เป็นโรคตับ (ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่ เป็นโรคตับ  
รุนแรง)
  - เป็นโรคหัวใจ
  - เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือ  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผล  
ต่อการรักษาหรืออาจเกิดอันตรายได้ เช่น  
ยาคีโทโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อรา  
ยาริทอนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์  
ยาไรแฟมพิซิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค  
ยารักษาโรคลมชัก  
ยาเจมไฟโบรซิล ซึ่งใช้ลดไขมันในเลือด  
ยาไซเมทิดีน ซึ่งใช้รักษาแผลในกระเพาะ  
ยาโคลพิโดเกล ซึ่งใช้ป้องกันเลือดแข็งตัว  
“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่  
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร**  
เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้  
ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้**ต้อง**ให้โดยแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทาง  
การแพทย์
- ยานี้ให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

**3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร**

- ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้

**3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่  
รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตาม  
ผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ และต้องคุมกำเนิดในระหว่าง  
ที่ได้รับยานี้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับ  
เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร  
ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง  
หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจเหนื่อยหอบ ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอกหรือ  
ไหล่

“หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

**5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้า  
มีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
- ปวดหรือชา บริเวณปลายมือ เท้า
- ความดันเลือดต่ำ อาจมีอาการเวียนหัวร่วมด้วย
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- หัวใจเต้นช้า
- รู้สึกเจ็บหรือมีอาการอักเสบในช่องปากหรือลิ้น
- มีอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
- มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวบริเวณเล็บ ผิวหนัง

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่า  
แกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- หลังจากผสมยาแล้วหากไม่ใช้ทันทีสามารถเก็บที่  
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 27 ชั่วโมง

**คำเตือน : ยานี้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายชนิด ใสไม่มีสีถึงเหลือง เล็กน้อย
    - บรารีโพอ ความแรง 30 มิลลิกรัม บรรจุในกล่อง ฉลากสีม่วง
    - บรารีโพอ ความแรง 100 มิลลิกรัม บรรจุในกล่อง ฉลากสีชมพู
    - บรารีโพอ ความแรง 300 มิลลิกรัม บรรจุในกล่อง ฉลากสีฟ้า
  - **ตัวยาสำคัญ** แพคลีแทกเซล
  - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Polyoxyl 35 castor oil (โพลีออกซิล 35 แคสเตอร์ออยล์), Citric acid anhydrous (กรดซิตริก แอนไฮเดรต) และ Ethanol anhydrous (เอทานอล แอนไฮเดรต)
- ผู้ผลิต** บริษัท เอ็มเอสเอ็น แลบบอราทอรีส์ ไพรเวต จำกัด, ประเทศอินเดีย
- ผู้นำเข้า** บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2565

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร