

โลซาร์แทน**ความแรง 50, 100 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม****ชื่อการค้า Tanzaril Teva 50, 100
(แทนซาริล เทวา 50, 100)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า โลซาร์แทน (Losartan)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคความดันเลือดสูง
- ใช้ป้องกันการเสื่อมของไตในผู้ป่วยความดันเลือดสูง และเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
- ใช้ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่หัวใจห้องล่างซ้ายโต
- ใช้รักษาหัวใจล้มเหลวเมื่อใช้ยาอื่นไม่ได้ผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งท้องเดือนที่ 3 ขึ้นไป หรือวางแผนจะตั้งท้อง เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในช่วงการตั้งท้อง
- เป็นผู้ป่วยไตทำงานบกพร่องรุนแรง
- เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่กินยาลดความดันอะลิสโคเรน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เคยมีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก คอ ลื่น
 - มีอาการอาเจียน หรือท้องเสียรุนแรง
 - ทานยาขับปัสสาวะ หรือกำลังคุมเกลือแร่ในอาหาร
 - เป็นโรคไต ปลูกถ่ายไต หรือไตทำงานผิดปกติ
- ดับทำงานบกพร่อง
- เป็นผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง มีปัญหาเส้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นๆ

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ได้แก่ หน้ามืด ความดันเลือดต่ำ หัวใจเต้นเร็วขึ้น หัวใจเต้นช้าลง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาทุกวันในเวลาเดิม
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หากตั้งท้องระหว่างใช้ยานี้ ให้หยุดยาทันทีแล้วรีบแจ้งแพทย์
- ยานี้อาจทำให้หิววังงขึ้นได้ในผู้ป่วยบางราย ควรระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- มึนงง บ้านหมุน หน้ามืด อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ง่วงซึม
- ปวดหัว เวียนหัว ใจสั่น
- ท้องเสีย ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน
- ผื่นขึ้น คัน บวมตามตัว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปทรงรี โค้งเล็กน้อย สีขาว ด้านหนึ่งมีรอยบาก อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข “50” และ “100”
 - **ตัวยาสำคัญ** โลซาร์แทน 50 และ 100 มก.
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส, สตาร์ชพรีเจลาตินส์, แมกนีเซียมสเตียเรต, สารเคลือบโอปาตรา
- ผู้ผลิต:** Teva Pharma, S.L.U., Zaragoza, Spain
ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2567