

ใบการคำ ทาโครลิมัส อีอาร์ เทวา 0.5  
ทาโครลิมัส อีอาร์ เทวา 1  
ทาโครลิมัส อีอาร์ เทวา 3  
ทาโครลิมัส อีอาร์ เทวา 5  
ชนิดแคปซูลปลดปล่อยแบบทยอย

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทา-โคร-ลิ-มัส (tacrolimus) เป็นยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือตับ
- ใช้เพื่อรักษาภาวะต่อต้านอวัยวะใหม่ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- แพ้ยากลูโคส อีโรโทรไมซิน คลาริโทรไมซิน อะซิโทรไมซิน หรือยาในกลุ่มเดียวกัน

“หากท่านไม่แน่ใจว่าแพ้ยานี้หรือไม่โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร”

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นหรือเคยเป็นโรคตับ
  - ตั้งท้อง สงสัยว่าท้อง หรือวางแผนจะมีลูก
  - มีแผนจะฉีดวัคซีนใดๆ
  - กำลังใช้ หรือเคยใช้ยาอื่นใด หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะยา หรือสมุนไพรบางชนิดอาจมีผลต่อการรักษา
- ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงให้นมลูก และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

1.3.1.3.1 Page

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แกะยาเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจจะเสียได้
- กินยานี้ในตอนเช้าขณะท้องว่าง วันละ 1 ครั้ง ควรกินยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ถึง 3 ชั่วโมง
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยวเม็ดยา
- ในช่องอะลูมิเนียมจะมีผงกันชื้น ห้ามรับประทาน

### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาการคลื่น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เกิดผื่นลมพิษ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดด ถ้าต้องออกแดดควรสวมเสื้อผ้ามืด ป้องกันหรือทาครีมกันแดด เพราะยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้เวียนหัว และง่วงนอน

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องร่วงมากกว่า 1 วัน
- ปวดท้องรุนแรง หนาวสั่น มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน

- มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว มองเห็นสีผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดหัว ตัวบวม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ยาจะมีอายุ 100 วันหลังจากเปิดของอะลูมิเนียม
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นแคปซูลบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวนวล มีตัวยาสำคัญคือ ทาโครลิมัส มี 4 ความแรง
- ขนาด 0.5 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีส้มอ่อน-เหลืองอ่อน มีตัวอักษร TR และตัวเลข 0.5 mg อยู่บนแคปซูล
- ขนาด 1 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีส้มอ่อน-ขาว มีตัวอักษร TR และตัวเลข 1 mg อยู่บนแคปซูล
- ขนาด 3 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีส้มอ่อน-ส้มอ่อน มีตัวอักษร TR และตัวเลข 3 mg อยู่บนแคปซูล
- ขนาด 5 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีส้มอ่อน-เทาอมแดง มีตัวอักษร TR และตัวเลข 5 mg อยู่บนแคปซูล
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ เอทิลเซลลูโลส, ไฮโปรมेलโลส, แลคโตสโมโนไฮเดรต, แมกนีเซียมสเตียเรท
- ผู้ผลิต: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company., Debrecen, Hungary
- ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: มกราคม 2564
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>