

ข้อสามัญทางยา เดสลอราทาติน**ความแรง 5 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ด****ชื่อการค้า DEZTANEX****(เดสทาเน็กซ์)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าเดสทาเน็กซ์ (DEZTANEX) มีตัวยา เดสลอราทาติน 5 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษา

- ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด/แน่นจมูก คันตา น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ
- ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน จำนวนและขนาดของผื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้]

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - โรคไต
 - โรคลมชัก
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - 1.3.1- กำลังตั้งครรภ์
 - 1.3.1.3- กำลังให้นมบุตรเพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบเพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อน หากมีการใช้ยาอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ง่วงซึมมากขึ้น
- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อยหรืออ่อนเพลียรุนแรง
- หัวใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น**

- ง่วงซึม

- ปากแห้ง
- ปวดศีรษะ
- ตาแดงหรือเคืองตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”****6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว ไม่นำไปแช่ในตู้เย็น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะเม็ดยาเป็นยาเม็ดกลมมนเคลือบฟิล์มสีฟ้า ขนาด 6 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “LT”

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข:

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่ง่วง
 2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีที่ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 3. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต
 4. การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin หรือ ยาต้านเชื้อรากลุ่ม Imidazole เช่น ketoconazole จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้น
- ผลิตโดย : บริษัท แอคทาวิส, ประเทศมอลตา
นำเข้าโดย : บริษัท สิลมการแพทย์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**