

Science Package Leader-11

เออร์โลทีนิบ

ความแรง 25, 100 และ 150 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า Lotyro 25, 100, 150

(ลวดทรีโร 25, 100, 150)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า เออร์โลทีนิบ (Erlotinib) มีตัวยา 25, 100, 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กตามแพทย์สั่ง
 - ยานี้ใช้ร่วมกับยาเจมไซทาบินในการรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้**
- แพ้น้ำตาลแลคโทส
 - กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูกหรือวางแผนจะตั้งท้อง ก่อนทำการรักษาหรือใช้ยานี้
 - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ ได้แก่ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านแบคทีเรีย ยาแก้อักเสบ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาควบคุมไขมันในเลือด กลุ่มสแตติน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตราย
 - ใส่คอนแทคเลนส์หรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตมาก่อน เช่น ตาแห้ง กระจกตาอักเสบ หรือแผลในตา

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้วันละ 1 ครั้งโดยกินก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังกินอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ให้กินทันทีที่นึกได้แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ไอ มีไข้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากคุณตั้งท้องในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายทำ ปวดท้องรุนแรง
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะมีสีเข้ม
 - บัสสาวะน้อย หรือบัสสาวะไม่ออก
 - ตาแดงผิดปกติ หรือเจ็บในตา
 - หายใจลำบากร่วมกับอาหารไอหรือมีไข้
 - มีอาการชา เดินเซ ตาพร่า
 - มีจุดแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เมื่ออาหาร น้ำหนักลด
 - น้ำตาไหลผิดปกติ ตาพร่า ตาไม่สู้แสง มีแผลในปากหรือที่ริมฝีปาก
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น แดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลวดทรีโร 25 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม สีขาว มีรอยพิมพ์ E 25 ด้านหนึ่งของเม็ดยา
- ลวดทรีโร 100 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม สีขาว มีรอยพิมพ์ E 100 ด้านหนึ่งของเม็ดยา
- ลวดทรีโร 150 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม สีขาว มีรอยพิมพ์ E 150 ด้านหนึ่งของเม็ดยา
- ตัวยาสำคัญ เออร์โลทีนิบ ไฮโดรคลอไรด์
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสทาลีน เซลลูโลส แล็กโตส โมโนไฮเดรต, โซเดียม สเตาซ โกลโคเลต, โซเดียม ลอริว ซัลเฟต, แมกนีเซียม สเตียเรต, ไฮโปรเมลโลส, ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส, โทเทเนียม ไดออกไซด์, โพรพิลีน โกลคอล, น้ำบริสุทธิ์

ผู้ผลิต MSN Laboratories Private Limited
Telangana, India

ผู้นำเข้า Mega Lifesciences Public Company
Limited

Samutprakarn, Thailand

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
• <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร