

Imatinib 100, 400 มก.ชนิดเม็ด

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า Imatinib Mesylate เป็นยา Imatinib

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไม้อิลอยด์ มะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค โรคทางโลหิตวิทยาที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้]

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- การป่วยและตายของทารกในครรภ์ : imatinib อาจเป็นสาเหตุให้ทารกในครรภ์เกิดอันตราย การตายของตัวอ่อนในครรภ์ และการลดลงของน้ำหนักตัวของตัวอ่อนในครรภ์ในการศึกษาในสัตว์
- ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด : หัวใจล้มเหลวรุนแรงและ หัวใจห้องล่างซ้ายทำงานผิดปกติ ถูกรายงานระหว่างมีการรักษาด้วย imatinib
- ผลต่อผิวหนัง: ตุ่มน้ำพุพองบริเวณผิวหนังรวมถึงผื่น erythema multiforme และ Stevens-Johnson Syndrome ถูกรายงานระหว่างมีการรักษาด้วย Imatinib

- ภาวะคั่งน้ำหรือบวม: ภาวะบวมน้ำเกิดขึ้นประมาณ 60-80% ของผู้ป่วยที่ได้รับ imatinib สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไม้อิลอยด์หรือมะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- **มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไม้อิลอยด์**

ผู้ใหญ่ ขนาดยา imatinib ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่แนะนำสำหรับการรักษาอันดับแรกของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไม้อิลอยด์ที่เกิดจากโครโมโซม Philadelphia คือ วันละ 400 มก. และเพิ่มระดับยาขึ้นเป็นวันละ 600 มก. และวันละ 800 มก. (ให้ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง)

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค สำหรับการรักษาการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคขนาดยา imatinib ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่แนะนำคือวันละ 600 มก.

มะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร

สำหรับการรักษามะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัด และ/หรือ อยู่ในระยะแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ขนาดยา imatinib ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่แนะนำคือวันละ 400 หรือ 600 มก.

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่มีข้อมูล

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- การรับประทานยาระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาทันทีเมื่อมีการตั้งครรภ์ ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ 14 วันหลังจากจบการรักษา

- Imatinib และเมตาบอลไลท์ถูกขับออกผ่านน้ำนมโดยอัตราส่วนปริมาณยาในน้ำนมและเลือดคือ 0.5 และ 0.9 ตามลำดับ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว ผู้ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยาดังกล่าว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เลือดกำเดาไหล อาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่
- เจ็บหน้าอก บวม หน้าบวม หน้าแดง ความดันโลหิตต่ำ
- โลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เลือดออก ระดับโปรตีนในเลือดต่ำ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- พวามิว เลือดออกในเยื่อเมือก
- ปวดข้อ ปวดหลัง ข้อบวม
- ท้องอืด ปวดท้อง เบื่ออาหาร ท้องผูก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2560

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**