

โพลาทูซูแมบ วิโดทิน 140 มิลลิกรัม ยาผงสำหรับฉีด ชื่อการค้า POLIVY (โพลีวี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โพลาทูซูแมบ วิโดทิน (polatuzumab vedotin) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ ในผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อยาและไม่สามารถเข้ารับการรักษาดูแลด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โดยใช้ร่วมกับยาเบนดามัสทีนและริทูซิแมบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อฉีดยานี้

- เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือ อ่อนเพลียมาก
- ระวังการติดเชื้อ และห้ามรับวัคซีนระหว่างใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น **เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค**
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่านโดยวิธี หยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมไปฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากนึกขึ้นได้ให้รีบไปฉีดยาทันที
- แพทย์จะแจ้งนัดการฉีดยาครั้งต่อไปให้กับท่าน

3.3 ถ้าฉีดยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- คุมกำเนิดระหว่างที่ใช้ยานี้ และคุมกำเนิดต่อไปอีก หลังหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 9 เดือน
- ระมัดระวังในการขับขี่ การทำงานกับเครื่องจักรหรือ ทำงานบนที่สูง **เพราะยานี้อาจทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย หรือเวียนหัว**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากฉีดยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลลอก มีจ้ำตามผิวน้ำ หรือเลือดออกผิปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม คันที่ผิวน้ำ
- โรคติดเชื้อ มีไข้ เป็นแรม งูสวัด
- มีเลือดออกผิปกติ มีจ้ำเลือด
- เดินเซ ตาพร่า หลงลืม พูดลำบาก

“หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 หากฉีดยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- มีอาการปวด คัน แดง บริเวณที่ฉีดยา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- ปวดข้อ ชาปลายมือ ปลายเท้า

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ารุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยากลับบ้าน
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ขวดแก้วบรรจุผงสีขาวถึงสีขาวอมเทา
- ตัวยาสําคัญ** โพลาทูซูแมบ วิโดทิน 140 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ใต้แก้ว กรดซัคซินิก โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซูโครส โพลีซอร์เบท20

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิต: บริษัทบีเอสพี ฟาร์มาซูติคอล เอส.พี.เอ ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือน 21 กุมภาพันธ์ 2563

[สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากเอกสารกำกับยา]