

**ริทูซิแมบ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร**  
**สารละลายเข้มข้นสำหรับหยดเข้าหลอดเลือด**  
**ชื่อการค้า RILIXIMA (ริลิกซิมา)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าริทูซิแมบ (Rituximab) เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี (โปรตีนชนิดหนึ่งที่ปกติจะผลิตโดยระบบร่างกายช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อและมะเร็ง)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดอื่น สำหรับ

- โรคลิมโฟมา ชนิด non-Hodgkin's lymphoma (NHL)
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด Lymphoid เรื้อรัง
- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- โรคหลอดเลือดอักเสบ ชนิด Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) (GPA) และชนิด Microscopic polyangiitis (MPA)
- โรคคุดม่านจากภูมิคุ้มกัน

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้ หรือโปรตีนจากหนู
- มีการติดเชื้อขั้นรุนแรง
- มีภูมิคุ้มกันต่ำ
- มีภาวะหัวใจวายขั้นรุนแรง

### 2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- เคยมีหรือมีภาวะตับอักเสบ
- เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือการหายใจ
- กำลังควบคุมระดับโซเดียมในร่างกาย เนื่องจากยามีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

ยานี้ใช้หยดเข้าหลอดเลือดดำของท่าน ก่อนได้รับยานี้ ท่านจะได้รับยาอื่นเพื่อป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงของยานี้

### 3.2 หากลืมนับยาตามกำหนด ควรทำอย่างไร

ติดต่อโรงพยาบาลที่รับการรักษาทันทีที่นึกได้

### 3.3 หากได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด แจ้งแพทย์หรือพยาบาล หากอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรรับยาตามกำหนดต่อเนื่อง เพื่อผลการรักษาที่ดี
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลการใช้ยา
- การขับรถ หรือ ทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง เพราะยานี้อาจทำให้รู้สึกง่วงนอน
- คมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น ฝังยาอนามัย หรือ ยาคุมกำเนิด ในช่วงที่รับการรักษา และต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังการรักษาเสร็จสิ้น
- ไม่ให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้ ในช่วงที่รับการรักษา และต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังการรักษาเสร็จสิ้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีไข้สูง เหงื่อออก ปวดหัวรุนแรง หายใจเร็ว มึนงง สับสน คล้ายจะหมดสติ
- เจ็บเค้นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น
- มีเลือดออกผิดปกติในช่องปาก จมูก หรือเกิดจุดจ้ำเลือดผิดปกติที่ผิวหนัง

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- คลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร ระบบขับถ่ายผิดปกติ
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนแรง ไม่มีแรง
- บวม น้ำ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา ขาบวมและแดง

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

1. ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้เก็บยานี้ให้แก่ท่าน
2. กรณีที่ท่านต้องเก็บยาไว้เอง:
  - เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ห้ามเขย่า
  - เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ขวดแก้วใสไม่มีสี บรรจุน้ำยาปราศจากเชื้อใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน
- โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต โพลิซอร์เบท80 กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ น้ำกลั่น

นำเข้าโดยบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2562