

## พาโลโนซีตรอน

ความแรง 0.075 มิลลิกรัมต่อ 1.5 มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายสำหรับฉีด

ชื่อการค้า ALOXI PONV

(อะล็อกซี่ พีโวโนว์)

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พาโลโนซีตรอน (palonosetron) เป็นยาในกลุ่มด้านอาเจียน

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ ป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

### 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในการณ์ต่อไปนี้
  - ผู้ที่มีประวัติห้องผูก หรือ ลำไส้อุดตัน
  - หญิงตั้งท้อง หญิงให้นมลูก-หลักเลี้ยงการใช้ยา
  - เว้นแต่แพทย์พิจารณาการใช้ยา หากมีเหตุผลทางการแพทย์
  - ผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาอาการซึมเศร้าบางชนิดและไม่เกรนบางชนิดร่วมด้วย เช่น ฟลูออกซีทิน พารอกซีทิน เชอร์ตราลีน เวนลาฟาเซ็น ร่วมกับยา อาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติ , อาการชัก กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระดูก

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่ามีอาการ หรือใช้ยาโดยยุ โปรดปรึกษาแพทย์และเภสัชกร

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- การใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ให้ยาให้แก่ท่านทางหลอดเลือดดำ

#### 3.2 หากท่านไม่ได้ฉีดยาเนื่องจากทำอย่างไร

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือ พยาบาลทันที

#### 3.3 ถ้าฉีดยาเนื่องจากทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเนื่องจากทำ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ควรระมัดระวัง การขับปัสสาวะ ไข้เครื่องจักรกล ระมัดระวังการขับข่ายน้ำนม หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เนื่องจากยาอาจทำให้หง่วงซึม

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

##### หันที่

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกดตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ตื่นตระหนก เกิดภาพหลอน เพ้อ

##### “หากมีอาการเหล่านี้

##### ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

#### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี

##### อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ห้องผูก หรือห้องเสีย
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
- สะอึก ป้ำกแห้ง
- อยากอาหารลดลง

ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ หรือ พยาบาล |

### 6. ควรเก็บยาไว้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา ยานี้บรรจุในขวดแก้วสีขาว น้ำยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส่ ไม่มีสี มีขนาดบรรจุ 1.5 มิลลิลิตร
- ตัวยาสำคัญ พาโลโนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ 0.075 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ไดแก่ mannitol (mannitol) โซเดียมเอเดเตต (disodium edetate) โซเดียมซิตรेट (sodium citrate) ซิตริกแเดชิด โนโนไซด์เรต (citric acid monohydrate)น้ำ (water for injection) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)กรดไฮโดรคลอโริก (hydrochloric acid)

ผู้ผลิต: FAREVA PAU ประเทศไทย

ผู้นำเข้า: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย |

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- [http://ndi.fda.moph.go.](http://ndi.fda.moph.go/)

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร