

**เมธิลเพรดนิโซโลน**  
**ความแรง 125 มิลลิกรัม 250**  
**มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม**  
**1 กรัมและ 2 กรัม**  
**ชนิดผงละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า M-prednisolone**  
**(เอ็ม-เพรดนิโซโลน)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อว่าเมธิลเพรดนิโซโลน โซเดียม ซักซิเนต (Methylprednisolone Sodium Succinate) มีตัวยา 125 มิลลิกรัม 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม 1 กรัม และ 2 กรัม เป็นยาในกลุ่มสเตอรอยด์

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ หรือลดการอักเสบที่รุนแรง และใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ที่แพทย์เห็นสมควร
- การใช้ยานี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากรุนแรงได้ จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยากกลุ่มสเตอรอยด์ชนิดอื่น
- ติดเชื้อราบริเวณกว้าง แต่ยังไม่ได้รับการรักษา
- ฉีดวัคซีนเมื่อไม่นานมานี้ หรือจะต้องรับการฉีดวัคซีนเร็ว ๆ นี้
- กำลังเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ เพราะยานี้ทำให้แผลรุนแรงขึ้นและกระเพาะอาหารหรือลำไส้ทะลุได้
- กำลังเป็นวัณโรค หรือกำลังติดเชื้อไวรัส เช่น อีสุกอีใส ทุ่งหวัด หัด หรือเริ่มที่กระจกตา เพราะทำให้โรคติดเชื้อเหล่านี้รุนแรงขึ้น

- กำลังเป็นโรคกระดูกพรุน เพราะทำให้กระดูกพรุนมากขึ้น กระดูกแตกหักง่ายขึ้น
- เป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง เพราะทำให้อาการทางจิตรุนแรง

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เด็ก อาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
- ผู้สูงอายุ เพิ่มความเสี่ยงต่ออันตรายจากยา
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเคยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากใช้ยาสเตอรอยด์
- โรคความดันเลือดสูง
- โรคต่อหิน โรคต่อกระຈก
- โรคตับ
- โรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ยังไม่ได้รับการรักษา
- โรคไต
- โรคไตร่อยดบางชนิด
- โรคเบาหวาน
- โรคลมชัก
- โรคหัวใจ
- กำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - ยาคุมกำเนิด
  - ยาแก้ชักที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
  - ยาขับปัสสาวะ
  - ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  - ยาต้านเบาหวาน
  - ยาต้านวัณโรค
  - ยาต้านไวรัสเอดส์
  - ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา วัคซีน
  - เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ

### 3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ความคุมการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเลือดออกในกระเพาะอาหาร
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีการป่วย เช่น ผู้ที่มีไข้หวัด ไอ จาม
- หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนอีสุกอีใส หรือโรคหัด

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ติดเชื้อรุนแรง
- หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หัวใจหยุดเต้น
- อาการท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

## 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นและให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดท้อง มีอาการคลื่นเหียน อยากจะอาเจียน  
“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ผงยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สีขาวถึงออกขาว
- ประกอบด้วยเมทิลเพรดนิโซโลน โซเดียม ซักซิเนท  
ความแรง 125 มิลลิกรัม 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม  
1 กรัม และ 2 กรัม

ผู้ผลิต บริษัทเอบีแอล เมดิคอล จำกัด

111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

**1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้**

**2. ห้ามใช้ในผู้ที่ติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย  
เว้นแต่ในกรณีจำเป็น**

**3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยด้วยโรคแผล  
ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้  
โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส**