

ไอซาวูโคนาโซล

แคปซูลชนิดแข็งสำหรับรับประทาน ชื่อการค้า CRESEMBA™ (เครสเซมบา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีตัวยา คือ ไอซาวูโคนาโซล(isavuconazole) เป็นยาด้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้รักษาโรคติดเชื้อราบางชนิดในผู้ใหญ่ ได้แก่:

- การติดเชื้อรา aspergillosis แบบลุกลามที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม 'Aspergillus'
- การติดเชื้อรา mucormycosis ที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม 'Mucorales' ในผู้ป่วยซึ่งไม่เหมาะสมที่จะได้รับการรักษาด้วยแอมโฟเทอริซิน บี (amphotericin B)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ
- กำลังใช้ยาชนิดใดต่อไปนี้:

- คีโตโคนาโซล (ketoconazole)
- ริโดนาเวียร์ (ritonavir)
- ริแฟมพิซิน (rifampicin) ไรฟาบูติน (rifabutin)
- คาร์บามาเซพีน (carbamazepine) ซี
- ยาในกลุ่มบาร์บิทูเรต เช่น ฟีนอบาร์บิทัล (phenobarbital)
- เฟนิโทอิน (phenytoin)
- ยาสมุนไพรวัว St John's wort
- เอฟฟาไวเรนซ์ (efavirenz) อีตราไวรีน (etravirine)
- นาฟซิลลิน (nafcillin)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากเคยแพ้ยาด้านเชื้อราอื่น
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคตับรุนแรง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- รับประทานยานี้อย่างถูกต้องตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเสมอ

3.2 ถ้าลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร.

- รับประทานแคปซูลทันทีที่นึกได้ หากใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องรับประทานยาคั้งถัดไป ให้ข้ามการรับประทานยาคั้งที่ลืมไป
- อย่ารับประทานยาโดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนยาคั้งที่ลืมไป

3.3 ถ้าหากได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที ไปโรงพยาบาลในทันที โปรดนำกล่องยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้

- ยานี้อาจทำให้คุณรู้สึกสับสน เหนื่อย หรือง่วงนอน ทั้งยังสามารถทำให้คุณหมดสติได้ หากเกิดอาการเช่นนี้ขึ้น อย่าขับขียานพาหนะหรือใช้เครื่องจักรกล

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- มีผื่น ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลาคอบวมร่วมกับหายใจลำบากรู้สึกเหนื่อย ตัวเหลือง ตาเหลือง
- มีตุ่มพองรุนแรงที่ผิวหนัง ปาก ตา หรืออวัยวะเพศ

"ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที"

5.2 อาการที่อาจเกิด เมื่อใช้ยา

- ปวดศีรษะ รู้สึกมึนงง กระสับกระส่าย ง่วงนอน
 - มีอาการเป็นเหน็บ ความรู้สึกสัมผัสหรือความรู้สึกในปากลดลง
 - ร้อนวูบวาบ วิดุกังวอล ปวดข้อ
 - ปากแห้ง ท้องเสีย อาเจียน การรับรสชาติเปลี่ยนไป
 - อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ใจต้อแสงมากขึ้น
- "ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บยาไว้ในกล่องยาเดิมเพื่อไม่ให้ยาโดนความชื้น

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- แคปซูลแข็ง ตัวแคปซูลสีน้ำตาลอมแดง ซึ่งพิมพ์ตัวเลข "100" ด้วยหมึกสีดำและปลอกแคปซูลสีขาวที่พิมพ์ตัวอักษร "C" ด้วยหมึกสีดำ
 - ตัวยาสำคัญ ได้แก่ ไอซาวูโคนาโซล 100 มิลลิกรัม
- ยานี้มี แมกนีเซียม ซิเตรต, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, ทาลค์, คอลลอยด์ดอล ซิลิกา และกรดสเตียริก เป็นส่วนประกอบ
- ยาบรรจุในแผงบลิสเตอร์อลูมิเนียม แต่ละแผงมียา 7 แคปซูล ช่องแคปซูลแต่ละช่องจะเชื่อมต่อกับช่องซึ่งมี 'สารดูดความชื้น' เพื่อป้องกันแคปซูลจากความชื้น
 - ห้ามกินสารดูดความชื้น

ผู้นำเข้า บ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2563

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**

PIL Title: Isavuconazole Capsule - Cresemba

PIL rev.no.: 1.1

Country: Thailand

Reference: LPD rev. no. 1.0 and EU SmPC, date: November 20, 2018