

**เจฟีทินิบ****ความแรง 250 มิลลิกรัม  
ชนิด ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม****ชื่อการค้า Gefiset 250 (เจฟีเซต 250)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า เจฟีทินิบ (Gefitinib) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มรักษาโรคมะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดระยะลุกลามที่มีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR-TK ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้นานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา****2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ กำลังให้นมลูก

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
  - เคยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับปอด
  - เคยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ
  - ใช้ยารักษาโรคอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ยาต้านชัก ยารักษาวัณโรค ยารักษาการติดเชื้อรา ยาที่ช่วยการนอนหลับ สมุนไพรที่รักษาอาการซึมเศร้า และวิตกกังวล ยาในกลุ่มรักษาอาการแสบกลางหน้าอกจากอาหารไม่ย่อยหรือยาที่ลดการหลั่งกรดในกระเพาะ และยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  - วางแผนจะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
  - เคยมีอาการท้องเสียเนื่องจากร่างกายย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้

**3. วิธีใช้ยา****3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- รับประทานพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้ ครั้งละ 1 เม็ดต่อวัน โดยต้องทานในเวลาเดียวกันทุกวัน
- หลีกเลี่ยงการทานยาลดกรด (antacids) 2 ชั่วโมงก่อนทานยาหรือ 1 ชั่วโมงหลังทานยานี้
- หากมีปัญหาการกลืน ให้ละลายยาด้วยน้ำเปล่า **เท่านั้น** ปริมาณครึ่งแก้ว ห้ามบดเม็ดยา แก้วจนเม็ดยาละลายหมด อาจใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วดื่ม และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มียาเหลืออยู่ เทน้ำเพิ่มอีกครั้งแก้ว แล้วดื่ม

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากลืมกินยา แต่ยังไม่เกิน 12 ชั่วโมงจากมือที่ลืมให้กินทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงจากมือที่ลืม ให้รอกินในครั้งถัดไป โดย**ไม่ต้อง**เพิ่มจำนวนยาเป็น 2 เม็ด

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ควรใช้นานี้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา****5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

- ท้องเสียติดต่อกันนานหรือท้องเสียอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร จนเกิดอาการร่างกายขาดน้ำ
- ปัญหาเกี่ยวกับตา ได้แก่ เจ็บตา ตาแดง น้ำตาไหล ตาแพ้แสง มีการมองเห็นที่ผิดปกติ ขนตาคุด ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดจากแผลที่กระจกตา

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”****5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ให้รีบแจ้งแพทย์ให้เร็วที่สุด**

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- มีผื่นลักษณะคล้ายสิ่ว อาจมีผื่นแห้ง แดงและอาการคันร่วมด้วย
- ไม่อยากอาหาร เมื่อยตัว
- ปากแห้ง เจ็บบริเวณเยื่อในช่องปาก
- ตาและเปลือกตาแดง
- ผมรั้ง เลือดกำเดาไหล
- ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะแสบขัด

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ให้รีบแจ้งแพทย์ให้เร็วที่สุด”****6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดกลม นูนสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาล ด้านหนึ่งมีอักษรตัว G อีกด้านหนึ่งผิวเรียบบรรจุแผงบลิสเตอร์ แผงละ 10 เม็ด กล่องละ 3 แผง
- **ตัวยาสำคัญ** เจฟีทีนิน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, แลคโตส โมโนไฮเดรต, ครอสพอวดีน, โปวีโดน เค 30, โซเดียมลอริลซัลเฟต, โซเดียม สตาร์ทซ์ ไกลโคเลต, แมกนีเซียม สเตียเรต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรไลซ์ บางส่วน, ทาลคัม, กลีเซอรอล โมโนคาพริลโลคาเพรต, ไทเทเนียม ไดออกไซด์, iron oxide red, iron oxide yellow และ iron oxide black

**ผู้ผลิต** บริษัท Genepharm S.A. ประเทศกรีซ

**ผู้นำเข้า** บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 30 กรกฎาคม พ.ศ.

2564

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**คำเตือน : ยานี้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**