

โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์  
ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด  
เพื่อการดำ ROCAINE Injection 2 mg/ml  
(โรเคน อินเจกชัน 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ (ropivacaine) เป็นยาชาเฉพาะที่

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้สั่งใช้โดยแพทย์โดย ใช้ระงับอาการปวดอย่างฉับพลัน

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยได้รับแจ้งว่ามีปริมาณของเหลวในเลือดน้อย
- ฉีดเข้าหลอดเลือด
- ฉีดเข้ามดลูกเพื่อบรรเทาปวดในระหว่างคลอด

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตับ หรือไต
- เป็นโรคเลือด เรียกว่า พอไฟเรีย (porphyria)
- เป็นเด็กแรกคลอด หรืออายุน้อยกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- กำลังใช้สมุนไพรหรือยาต่อไปนี้ ยาต้านซึมเศร้า
- ยาฆ่าเชื้อรา เพราะอาจส่งผลการรักษาได้

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้  
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน
- 3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดแล้วมีอาการ เช่น มึนงง ลึนชา ปากชา ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ ทำงานกับเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้หงวซึม
- ถ้าต้องหยุดใช้ยาอย่างฉับพลันให้ปรึกษาแพทย์

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ชัก
- รู้สึกมึนงง เวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้

### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- รู้สึกชาคล้ายเข็มทิ่ม
- หัวใจเต้นเร็ว หรือช้าผิดปกติ
- ปวดท้ายทอย
- รู้สึกตัวร้อน หรือหนาวสั่น
- ปวดหลัง

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาน้ำปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สี ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ โรพิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, และน้ำ สำหรับยาฉีด

### ผู้ผลิต

รียอน ฟาร์มาซูติคอล สาธารณรัฐเกาหลี

### ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด  
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดี  
รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ตุลาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>