

**เออโลทินิบ**  
**ความแรง 100, 150 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า Erlotinib Teva**  
**(เออโลทินิบ เทวา)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เออโรโลทินิบไฮโดรคลอไรด์ (erlotinib hydrochloride) มีตัวยา 100 และ 150 มิลลิกรัม

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอด ชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายโดยใช้รักษาร่วมกับยาเจมไซทาบิน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากคุณแพ้น้ำตาลแลคโทส
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก หรือวางแผนจะตั้งท้องก่อนทำการรักษาหรือใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตราย ได้แก่ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยากันชัก ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาควบคุมไขมัน ในเลือดกลุ่มสแตติน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด
- แจ้งแพทย์หากคุณใส่คอนแทคเลนส์ หรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามาก่อน เช่น ตาแห้ง กระจกตาอักเสบ หรือแผลในตา

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น **เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค**
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง โดยกินก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังกินอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ไอ มีไข้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากคุณตั้งท้องในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ ปวดท้องรุนแรง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม
- ปัสสาวะน้อย หรือปัสสาวะไม่ออก
- ตาแดงผิดปกติ หรือเจ็บในตา
- หายใจลำบากร่วมกับอาการไอ หรือมีไข้
- มีอาการชา เดินเซ ตาพร่า
- มีจุดแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- น้ำตาไหลผิดปกติ ตาพร่า ตาไม่สู้แสง
- มีแผลในปาก หรือที่ริมฝีปาก

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น แดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

#### 7.1 ลักษณะยา

- เออโรโลทินิบ เทวา 100 เป็นยาเม็ดกลมมน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร A116 อีกด้านหนึ่งเรียบ
- เออโรโลทินิบ เทวา 150 เป็นยาเม็ดกลมมน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร A127 อีกด้านหนึ่งเรียบ

#### 7.2 ส่วนประกอบอื่นๆของยา

- ยานี้มีส่วนประกอบของแลคโทส แอนไฮดรัส, โซเดียม สตาโรซ โกลโคเลท, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, โซเดียม สเตียริล ฟูมาเรท, ซิลิกา ไฮโดรโฟบิก คอลลอยดอล, ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส, โททาเนียม ไดออกไซด์ และโพลีเอทิลีน ไกลคอล

คำเตือน ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผลิตโดย : เอส.ซี. ซินดาน-ฟาร์มา เอส.อาร์.แอล.

ประเทศโรมาเนีย

นำเข้าโดย : บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย  
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**