

เอปตินิซูแมบ
ความแรง 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด
ชื่อการค้า Vyepti (ไวเยปติ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เอปตินิซูแมบ (Eptinezumab)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ป้องกันอาการปวดหัวไมเกรนในผู้ใหญ่ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

ยานี้จะลดจำนวนวันที่เป็นไมเกรนและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและจะรู้สึกได้ตั้งแต่หลังจากได้รับยา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีดังต่อไปนี้

- เป็นโรคหัวใจ
- ยานี้ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีระหว่างได้รับยาหรือภายหลังได้รับยาแล้ว ให้แจ้งแพทย์ทันทีถ้ามีอาการต่อไปนี้ หายใจลำบาก ซีพจรเต้นเบาหรือความดันโลหิตต่ำอย่างรวดเร็ว (ท่านจะรู้สึกวิงเวียน หน้ามืด) บวมที่เปลือกตาหรือลิ้น ผิวหนังคันอย่างรุนแรง หรือผื่นแดง
- เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะไม่มีข้อมูลการศึกษา
- แจ้งรายชื่อยาที่ใช้หรืออาจจะให้อยู่ให้แพทย์ทราบ
- สตรีที่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนจะมีบุตร
- ยานี้ไม่มีผลหรือมีผลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขี่หรือทำงานกับเครื่องจักร
- ถ้ามีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลฟรุกโตสแต่กำเนิด ไม่สามารถฉีดยานี้ได้ เพราะยามีส่วนประกอบของซอร์บิทอล ซึ่งเป็นแหล่งของน้ำตาลฟรุกโตส
- ถ้าบุตรหลานกินอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวานไม่ได้ เพราะจะทำให้รู้สึกไม่สบาย อาเจียนหรือรู้สึกไม่ดี เช่น ท้องอืด ปวดท้องหรือท้องเสีย ให้แจ้งแพทย์ก่อนฉีดยา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ท่านจะได้รับยาไวเยปติโดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยาแก่ท่าน
- ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มิลลิกรัม ทุก 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับยาขนาด 300 มิลลิกรัม ทุก 12 สัปดาห์ ขึ้นกับการปรับขนาดยาของแพทย์

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการให้ยาครั้งถัดไป

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยังไม่มียาด้านพิษเมื่อได้รับไวเยปติเกินขนาด ถ้าท่านคิดว่าอาจจะได้รับยาเกินขนาด ให้รีบพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลิ้น
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ ผิวหนังคันอย่างรุนแรง
- ซีพจรเต้นเบาหรือความดันโลหิตต่ำอย่างรวดเร็ว (ท่านจะรู้สึกวิงเวียน หน้ามืด)

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คัดจมูก เจ็บคอ
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บขวดยาไว้ในกล่องเพื่อป้องกันแสง เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งหรือแช่ขวดยา
- ยาที่เตรียมแล้วให้เก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และควรใช้ภายใน 8 ชั่วโมง
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอม ยาเปลี่ยนสีหรือขุ่นขึ้น
- ไม่ทิ้งยานี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อต้องการทิ้งยาโปรดถามเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ไวเยปติเป็นสารละลายใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองออกน้ำตาล

- ด้วยยาสำคัญได้แก่ เอปิตินซูแมบ ในแต่ละขวด ประกอบด้วย เอปิตินซูแมบ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ sorbitol, L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, polysorbate 80 และ water for injection
- ผลิตโดย H. Lundbeck A/S, ประเทศเดนมาร์ก
- นำเข้าโดย บริษัท บี.อีล.ฮั่ว จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร 02-4370154
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2566

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**