

พรีกาบาลิน

ความแรง 75, 150 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า PREGAB (พรีแก็บ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าพรีกาบาลิน (Pregabalin) มีตัวยา 75, 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาทในสมอง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิตกกังวลทั่วไป กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีนงงและง่วงนอนผิดปกติ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
 - โรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
 - หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ได้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
 - หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
 - ยานี้อาจเสริมฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และยาคลายกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน
 - ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับออกซีโคโดน เพราะอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางการรับรู้และการเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์จะเป็นผู้กำหนดขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
- แพทย์อาจให้กินยานี้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันแต่ละวัน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม, มีนงง, กระสับกระส่าย และกระวนกระวาย เป็นต้น ให้นำกล่องหรือขวดยาดัดตัวไป พร้อมกับให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มีนงง ง่วงนอนผิดปกติ
 - เดินเซ ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน พูดไม่ชัด สูญเสียความทรงจำ สมดุลการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 - สายตามัวชั่วคราว เห็นภาพซ้อน
 - ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องผูก
 - บวมตามแขนขา
 - อยากอาการ และน้ำหนักเพิ่ม
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา** เป็นยาแคปซูล มี 2 ความแรง ดังนี้
 - พรีแก็บ 75: ชนิดแคปซูลสีแดง-ขาว ภายในบรรจุผงยาสีขาว มีตัวยา 75 มิลลิกรัม
 - พรีแก็บ 150: ชนิดแคปซูลสีขาว ภายในบรรจุผงยาสีขาว มีตัวยา 150 มิลลิกรัม
- ตัวยาสำคัญ** พรีกาบาลิน
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโซเดียม, คอลลอยด์อล ซิลิโคนไดออกไซด์, ทาลคัม, แมกนีเซียมสเตียเรต, เจลาติน, ไทเทเนียมไดออกไซด์

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย : บริษัท มิลลิเมต จำกัด,
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร