

# โซราเฟนิบ ความแรง 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า Sorafenib Alvogen (โซราเฟนิบ อัลโวเจน)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โซราเฟนิบ (sorafenib) เป็นยาในกลุ่มรักษาโรคมะเร็ง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งตับ
- รักษามะเร็งของเนื้อเยื่อไต
- รักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - โรคตับ
  - โรคหัวใจ
  - หญิงให้นมบุตร
  - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  - กำลังใช้ยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่น ร่วมกับ เพราะ อาจมีผลต่อการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา ได้แก่ ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น นิโอมัยซิน เป็นต้น

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลา กินตามขนาดยาและคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- ควรกินยาในขณะท้องว่าง โดยกินยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือกินยาหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
- ให้กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ภายในวันนั้น แต่ถ้าหากใกล้เวลากินของมื้อถัดไป ให้รอกินยาในมื้อถัดไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนหมดตามที่แพทย์สั่ง
- ผู้หญิงที่กำลังกินยานี้จะต้องมีการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัด หากพบการตั้งครรภ์ต้องแจ้งแพทย์ทันที

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - หัวใจเต้นผิดปกติ
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่如果有อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย
- มีไข้ เวียนหัว ปวดหัว
- ผมร่วง คัน ผื่น
- น้ำหนักลด ผิวแห้ง
- ปวดข้อ เจ็บที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
- ความดันโลหิตสูง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่如果有อาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### • ลักษณะยา

เป็นเม็ดกลมเคลือบฟิล์ม นูนทั้งสองด้าน สีน้ำตาลแดง ด้านหนึ่งมีตัวเลข 200 อีกด้านหนึ่งไม่มีรอยพิมพ์

### • ตัวยาสำคัญ โซราเฟนิบ (sorafenib)

### • ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

โครสคาร์เมลโลสโซเดียม (Cros Carmellose sodium), ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (Microcrystalline cellulose), ไฮโปรเมลโลส (Hypromellose), โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium laurilsulfate), แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium stearate), แมคโครกอล (Macrogol), ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide), เรดไอรอนออกไซด์ (Red iron oxide)

ผู้ผลิต Remedica Ltd., Cyprus

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

