

ลาทาโนพรอส
ความแรง 0.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดยาหยอดตา
ชื่อการค้า Latoprost (ลาโทพรอส)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลาทาโนพรอส มีตัวยา 0.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ เพื่อลดความดันในลูกตาสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดหรือมีความดันในลูกตาสุง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยโรคต้อหิน
 - สวมใส่คอนแทคเลนส์
 - ผู้ป่วยโรคหอบหืด
 - ติดเชื้อไวรัสเริมที่ตา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาทั่วไปคือ 1 หยด หยอดเข้าตาข้างที่เป็น วันละ 1 ครั้ง

• วิธีใช้ยาหยอดตา

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีสีหรือขุ่น
 - อย่าใช้ยานี้หากภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
3. นอนหงายหรือเงยหน้าขึ้น แล้วหยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1 หยด
4. ขณะใช้ยาหยอดตา ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณปลายหลอดสัมผัสกับดวงตา ขนตา มือหรือสิ่งอื่นๆ
5. หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรเว้นให้ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมหยอดยา ให้หยอดยาปกติในวันถัดไป และไม่ควรหยอดยาเกินวันละ 1 ครั้ง

3.3 ถ้าหยุด ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล จนกว่าจะมองเห็นชัดเจน เนื่องจากหลังหยอดยานี้ จะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยาและใส่กลับหลังใช้ยา 15 นาที เพื่อป้องกันคอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี
- อย่าหยุดยาเอง เว้นแต่แพทย์สั่ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ม่านตาเปลี่ยนสี
- ตามัวจากความผิดปกติที่จุดรับภาพ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ตาแดง ปวดตา ระคายเคืองตา น้ำตาไหล
- เปลือกตาคัลล้า ความยาวและความหนาขนตาเพิ่มขึ้น

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้อธิบายมา
- เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บในช่องแช่แข็ง
- หลังเปิดขวดยา เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส โดยเก็บไว้ไม่เกิน 4 สัปดาห์
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา :** ขวดพลาสติกสีขาวพร้อมหลอดหยดบรรจุสารละลายใส ไม่มีสี ขวดละ 2.5 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสําคัญ :** ลาทาโนพรอส 0.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ เบนซาอิลโคเนียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต, ไดโซเดียมฟอสเฟต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, น้ำสำหรับยาปราศจากเชื้อ

ผู้ผลิต RAFARM SA

Piraeus, Greece

ผู้นำเข้า Mega Lifesciences Public Company Ltd.

Samutprakarn, Thailand

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**