

อีโพอีทิน เซต้า

20000 ใอายุ , 30000 ใอายุ , 40000 ใอายุ

ชนิดสารละลายบรรจุหลอดยาพร้อมฉีดยา
ชื่อการค้า **EPO STADA (อีโพอ สตาดา)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอีโพอีทิน เซต้า (epoetin zeta) เป็นยา กลุ่มกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรัง
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
- เพื่อเตรียมเลือดตัวเองไว้ใช้สำหรับการผ่าตัดใหญ่
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยมีภาวะขาดธาตุเหล็ก ก่อนผ่าตัดกระดูก
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยภาวะไขกระดูกทำงานผิดปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย **ความดันเลือดสูง** ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่จะผ่าตัดข้อเข่าที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือด หรือไม่สามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มี **โรค** เกี่ยวกับ **หลอดเลือด** ที่ไปเลี้ยง **สมอง**

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ ถ้ากำลัง **ตั้งครรภ์** หรือให้นมบุตร
- แจ้งแพทย์ ถ้าเป็น **โรคความดันเลือดสูง**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีประวัติ **โรคลมชัก**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามี **ภาวะไตวายเรื้อรัง**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีการทำงานของ **ไตบกพร่อง**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามี **ภาวะหลอดเลือดตีบตัน**
- แจ้งแพทย์ ถ้าเคยใช้ยากกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดมาก่อน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ท่าน โดยฉีดเข้าใต้หนัง

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบไปฉีดยาทันทีที่นึกได้
- ถ้านึกขึ้นได้ในวันที่จะฉีดยาครั้งถัดไป ให้ข้ามครั้งที่ลืม และไม่ต้องฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้าท่านสงสัยว่าฉีดยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระหว่างการใช้ยานี้ต้องตรวจวัด **ความดันเลือดอย่างสม่ำเสมอ**
- ต้องแจ้งแพทย์ทราบก่อนผ่าตัด ว่าใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการของลิ่มเลือดอุดตัน เช่น หายใจลำบาก ปวดแน่นหน้าอก ปวดขา แขนขาซีดเย็น มึนงง พุดลำบาก พุดไม่ชัด

“หากเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูง ปวดหัวปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ปวด บวม บริเวณที่ฉีดยา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา”

“แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต: Rovi Contract Manufacturing, Spain

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท สตาดา(ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้ฉีดชนิดน้ำใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดยาพร้อมฉีดยา
- **ความแรงของยา EPO STADA 40000 IU/ml**
- ประกอบด้วย
 - อีโพออีทิน เซต่า 20000 ใอญ /0.5 มิลลิลิตร และ สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.25 มิลลิกรัม
 - อีโพออีทิน เซต่า 30000 ใอญ /0.75 มิลลิลิตร และ สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.38 มิลลิกรัม
 - อีโพออีทิน เซต่า 40000 ใอญ /1 มิลลิลิตร และ สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.50 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ
 - ไดโซเดียมฟอสเฟตดีไฮเดรต, โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตดีไฮเดรต, เกลือแกง, แคลเซียมคลอไรด์ดีไฮเดรต, โพลีซอเบท 20, ไกลซีน, ลิวซีน, ไอโซลิวซีน, ทรีโอซีน, กรดกลูตามิค, เฟนิลอลานีน, น้ำกลั่นสำหรับฉีด และ สารปรับความเป็นกรดต่าง คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ กรดเกลือ

ผู้ผลิต: Rovi Contract Manufacturing, Spain

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท สดาดา(ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ตุลาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**