

อะคาริแซกซ์
ความแรง 12 SQ-HDM
ชนิดเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า สารสกัดไรฝุ่นบ้าน มีสองชนิดรวมกัน คือ สายพันธุ์ *Dermatophagoides pteronyssinus* และ *Dermatophagoides farina* เป็นยาในกลุ่มรักษาภูมิแพ้
- ยานี้ใช้รักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากการแพ้ไรฝุ่นบ้านบางชนิดในผู้ป่วยอายุ 12-65 ปี
- ยานี้ใช้รักษาโรคหอบหืดที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากการแพ้ไรฝุ่นบ้านบางชนิดในผู้ป่วยอายุ 18-65 ปี)
- การใช้ยานี้จะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาโรคภูมิแพ้เท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

ใช้ยาครั้งแรกต้องใช้ต่อหน้าแพทย์หรือพยาบาล และดูอาการต่ออย่างน้อย 30 นาทีหลังจากใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบในยานี้ เช่น เจลาตินจากปลา แมนนิทอล และ โซเดียมไฮดรอกไซด์
- เคยเป็นโรคหอบหืดรุนแรงใน 3 เดือนก่อน
- กำลังกินยากดภูมิคุ้มกันหรือยารักษามะเร็ง
- เพิ่งถอนฟัน ผ่าตัดในช่องปาก มีแผลในช่องปาก หรือมีการติดเชื้อในช่องปาก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้


ควรแจ้งแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังใช้ยารักษาอาการภูมิแพ้ เช่น ยาต้านฮิสตามีน ยารักษาอาการหอบหืด หรือ สเตียรอยด์
- มีอาการซึมเศร้าและต้องรับประทานซึมเศร้า
- เคยมีอาการแพ้รุนแรงหลังได้รับการฉีดสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นบ้าน
- เคยแพ้อาหารจำพวกปลา
- เคยมีอาการแสบร้อนกลางอกที่นานกว่าปกติหรืออาการกลืนลำบาก
- กำลังตั้งครรภ์ ไม่ควรเริ่มใช้ยานี้ในช่วงตั้งครรภ์ หากพบว่าตั้งครรภ์ภายหลัง ควรปรึกษาแพทย์
- กำลังให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์หากใช้ยาในช่วงให้นมบุตร


3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้


- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- วิธีแกะเม็ดยาอย่างถูกต้อง
เช็ดมือให้แห้งก่อนหยิบยา และแกะเม็ดยาตามรูป



1. ฉีกแผงยาตามลูกศรสามเหลี่ยมด้านบนสุด




2. ฉีกแผงยาตามรอยประ




3. ดึงฟอยด์ยาออกตามลูกศร

ห้ามออกแรงดันให้ยาทะลุออกมาจะทำให้ยาแตกเสียรูป



4. นำเม็ดยาออกจากแผงยาอย่างระมัดระวังและใช้ยาในทันที



5. วางเม็ดยาที่ใต้ลิ้น ปล่อยให้เม็ดยาอยู่ใต้ลิ้นจนกว่าจะละลายหายไป

• วิธีการกินยา

อมใต้ลิ้น ครั้งละ 1 เม็ดต่อวัน

ห้ามกลืนน้ำลาย อย่างน้อย 1 นาที

ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากรับประทานยาอย่างน้อย 5 นาที

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ให้ใช้ยาทันทีที่นึกได้ในวันนั้น ไม่ควรใช้ยา 2 เม็ดในวันเดียวกัน
- หากลืมใช้ยานานเกินกว่า 7 วัน โปรดติดต่อแพทย์ก่อนกลับมาเริ่มใช้ยาอีกครั้ง

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากใช้ยาเกินขนาดอาจได้รับผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น อาการแพ้ที่ปากและลำคอ หากเกิดอาการแพ้รุนแรง ให้รีบพบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ทนไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- การรักษาต้องใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 14 สัปดาห์ จึงจะเริ่มเห็นผล
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องผ่าตัดในช่องปาก หรือถอนฟัน
- แจ้งแพทย์ หากเกิดอาการแพ้บริเวณปากหรือช่องปากรุนแรง หรือทนต่ออาการแพ้ไม่ได้ แพทย์อาจให้ยาต้านอาการแพ้ เช่น ยาต้านฮีสตามีนเพื่อลดอาการที่เกิดขึ้น
- อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมักหายภายในไม่กี่นาที่หรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากใช้ยา และผลข้างเคียงจะลดลงหลังจากใช้ยาไปประมาณ 1-3 เดือน
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากพบอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้แล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการหอบหืดที่เป็นอยู่แย่ลงจากปกติ
- มีอาการแพ้ขั้นรุนแรง เช่น กลืนลำบาก หายใจลำบาก เสียงเปลี่ยน ความดันโลหิตต่ำ รู้สึกจุกแน่นที่คอ อาการบวมบริเวณหน้า ช่องปาก ช่องคอ หรือ ผิวหนัง
- มีอาการลมพิษและอาการคันที่ผิวหนัง

“ต้องหยุดยารับไปพบแพทย์ทันที”

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- รู้สึกคันภายในช่องคอ ปาก ลิ้น หรือ หู
- มีอาการบวม อักเสบ แสบร้อน บวมแดงบริเวณริมฝีปาก ลิ้น ช่องคอ แผลในช่องปาก เจ็บภายในช่องปาก
- รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่ม หรือ รู้สึกชา ภายในช่องปากหรือลิ้น
- เสียงแหบ ปากแห้ง กลืนลำบาก การรับรสเปลี่ยนไป
- ต่อมทอลซิล ต่อมน้ำลาย ขยายใหญ่ขึ้น หรือหลังน้ำลายมากขึ้น
- ตาอักเสบ คันตา
- รู้สึกไม่สบายช่องหู จมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม หอบหืด ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
- รู้สึกปวดหรือรู้สึกไม่สบายกระเพาะอาหาร ระคายเคืองหลอดอาหาร รู้สึกอาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก
- เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- รู้สึกเหนื่อย แน่นหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติไป
- รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว
- ผิวหนังแดง รู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มที่ผิวหนัง

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่มิดชิดให้พ้นมือเด็ก
- ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางท่อน้ำทิ้งและบริเวณทิ้งขยะของบ้าน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผลิตโดย:

Catalent UK Swindon Zydis Ltd.
Frankland Road
Blagrove, Swindon
Wiltshire, SN5 8RU
ประเทศสหราชอาณาจักร

ตรวจสอบปล่อยผลิตภัณฑ์โดย:

ALK-Abelló A/S
Bøge Alle 6-8
2970 Hørsholm
Denmark

นำเข้าโดย:

บริษัท แอ็บบอด ลาบอแรตอริส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าท์ ลุมพินี ชั้น 30 และ ชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

วันที่ทบทวนเอกสารล่าสุด <มีนาคม 2561>