

ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Mycophenolate Teva
500
(ไมโคฟีโนเลต เทวา 500)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล (mycophenolate mofetil) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ไต หรือหัวใจ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ⊗ ห้ามใช้ยานี้ หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจการตั้งครรภ์ก่อนใช้ยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
 - ผู้ป่วยหญิงต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อน เพราะยาอาจทำให้แท้งบุตรหรือทำให้ทารกในครรภ์พิการได้
 - มีแผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหาร
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยาลดกรดหรือยาที่ยับยั้งการหลังกรด ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด ยาจับฟอสเฟต โคลเลสโพรอามีน รินแฟมพิซิน ไอซาวูโคนาโซล เทลมิซาร์แทน
- “ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่”**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบดหรือแบ่งยา

- 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร**
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ได้รับบริการว่ากำลังใช้ยานี้
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ก่อนฉีดวัคซีนให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบว่ากำลังใช้ยานี้ **เพราะยานี้อาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อเป็น**
- งดการบริจาคเลือดในระหว่างใช้ยานี้ และงดต่อไปอีก 6 สัปดาห์หลังหยุดยา
- ต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ **เพราะยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อทารก และเมื่อรู้ว่าจะตั้งครรภ์ ต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที**
- ผู้ป่วยชายและคุณอนควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- ไม่บริจาคอสุจิขณะใช้ยานี้ และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยสวมใส่เสื้อผ้า และทาครีมกันแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำกัดผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- อาเจียน วิดกักกล นอนไม่หลับ เวียนหัว ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน **เพราะยาอาจเสียได้**
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ผิวเรียบ 2 ด้าน รูปร่างคล้ายแคปซูล สีม่วง ด้านหนึ่งสลักตัวอักษร 'AHI' และอีกด้านสลักตัวเลข '500'
- **ตัวยาสำคัญ** ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), Povidone (โพรโตน), Hydroxypropyl cellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส), Croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม), Talc (ทัลค), Magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท)

ผู้ผลิต: Intas Pharmaceuticals Limited Gujarat, India

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: เมษายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร