

Seque Package Leaflet - Thai

แคปไซตาบิน 150 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
แคปไซตาบิน 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Captemis 150(แคปเทมิส 150), Captemis 500(แคปเทมิส 500)

1. ยานี้คืออะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร
ยานี้มีชื่อว่า แคปไซตาบิน เป็นยาหยุดการเจริญการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งเต้านม และใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ้ำอีกหลังจากตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
 - เคยแพ้ยากลุ่มฟลูโอโรไพริมิดีนอย่างรุนแรง (กลุ่มยาที่รักษามะเร็ง เช่น ฟลูโอโรยูราซิล)
 - กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
 - ระดับเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเกล็ดเลือดต่ำมาก
 - มีปัญหาตับ หรือไตอย่างรุนแรง
 - มีภาวะขาดเอนไซม์ ดีพีดี

- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากมีภาวะดังต่อไปนี้
 - มีปัญหาตับหรือไต
 - มีหรือเคยมีปัญหาหัวใจ
 - มีโรคทางสมอง ทางระบบประสาท หรือทางตา เป็นโรคเบาหวาน
 - มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง

- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคเก๊าท์ ได้แก่ อัลโลพูรินอล ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วอร์ฟาริน ยาต้านชัก เช่น เฟนิโทอิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- ควรใช้ยาตามขนาดและวิธีใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารไม่เกิน 30 นาที เข้าและเย็น
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร
- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- ให้ติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดก่อนทานยามื้อต่อไป โดยท่านอาจมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องร่วง แผลในปาก ปวดท้อง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- คุมกำเนิด เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจทำให้ง่วงและอ่อนเพลีย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องร่วงมากกว่า 4 ครั้ง หรือท้องร่วงตอนกลางคืน
- อาเจียนมากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
- เบื่ออาหารจนกินได้น้อยกว่าปกติ ตัวเหลือง ตาเหลือง
- เจ็บ บวม แดง มีแผลที่ปาก
- ใช้สูง หนาวสั่น รู้สึกเหนื่อย ปวดท้อง
- ปวด บวม แดง รู้สึกชา ที่มือหรือเท้า
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
- เดินเซ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
- ปวดท้อง
 - อ่อนเพลีย
 - คัน ผื่นที่ผิวหนัง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา
แคปเทมิส 150 เป็นยาเม็ดรูปรี เคลือบฟิล์ม สีชมพูอ่อน
แคปเทมิส 500 เป็นยาเม็ดรูปรี เคลือบฟิล์ม สีชมพู

ส่วนประกอบอื่นๆ

Lactose anhydrous, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium,
Hypromellose, Magnesium stearate, Purified water และสีจาก Opadry pink

ผลิตโดย: บริษัท Reliance Lifesciences Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย

นำเข้าโดย: บริษัท เมก้า ไบโอฟาร์มา จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2564

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร