

## อิรินูแมบ

ความแรง 70 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

### ชนิดยาฉีด

ชื่อการค้า Aerinex (แอรินเนกซ์)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า อิรินูแมบ (Erenumab) มีตัวยา 70 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มป้องกันไมเกรน

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ป้องกันอาการปวดหัวไมเกรนในผู้ใหญ่ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- แพ้ยาธรรมชาติ เนื่องจากหลอดเลือดมีน้ำยาธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
- เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะไม่มีข้อมูลการศึกษา
- มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะไม่มีข้อมูลการศึกษา
- สตรีที่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนที่จะมีบุตร
- แจ้งรายชื่อยาหรืออาหารเสริมที่ท่านใช้อยู่ ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยานี้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนฉีดยา นำยาออกจากตู้เย็นมาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที และห้ามเขย่าหลอดยา
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง เดือนละ 1 ครั้ง ที่บริเวณหน้าท้องหรือต้นขา อาจฉีดที่ต้นแขน หากมีผู้อื่นฉีดให้
- หากแพทย์สั่งให้ใช้ยาขนาด 70 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เข็ม ให้ฉีดยาเข็มที่สองทันทีหลังฉีดเข็มแรก
- เปลี่ยนบริเวณที่ฉีดทุกครั้ง ไม่ฉีดที่จุดเดิม
- ไม่ฉีดยาในบริเวณที่ผิวหนังแดง มีแผลหรือมีรอยแดง ฟกช้ำ
- ผู้ป่วยห้ามฉีดยาเอง จนกว่าจะได้รับการสอนจากแพทย์หรือพยาบาลในการเตรียมยาและวิธีการฉีดยาที่ถูกต้อง

### 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

หากลืมฉีดยาให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้ แล้วพบแพทย์เพื่อปรับการให้ยาครั้งต่อไป

### 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวด บวมหรือแดง ตรงบริเวณที่ฉีดยา
- ท้องผูก
- กล้ามเนื้อหดเกร็ง
- คัน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นของธรรมดา (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง
- ยาที่นำออกจากตู้เย็นแล้ว ห้ามนำกลับไปเก็บในตู้เย็นอีก
- ยาที่นำออกจากตู้เย็น และยังไม่ได้แกะกล่อง มีอายุไม่เกิน 14 วัน ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
- ไม่ทิ้งยานี้รวมกับขยะทั่วไป เมื่อท่านต้องการทิ้งยาโปรดถามแพทย์หรือเภสัชกร
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ อีริทรมัย 70 มิลลิกรัม บรรจุในเข็มฉีดยาพร้อมฉีดยา (pre-filled syringe) หรือ ปากกาพร้อมฉีดยา (pre-filled pen)

มี 2 รูปแบบ

- สารละลาย **70 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร** บรรจุในเข็มฉีดยาพร้อมฉีดยา (pre-filled syringe)
- สารละลาย **70 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร** บรรจุในเข็มฉีดยาอัตโนมัติหรือแบบปากกาพร้อมฉีดยา (pre-filled pen)

- **ตัวยาสำคัญ** ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ตัวยา อีริทรมัย 70 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ซุโครส, เกลือโซเดียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, โพลีซอร์เบต 80, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ น้ำกลั่น

ผู้ผลิต Amgen Manufacturing Limited, USA  
ผู้นำเข้า บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพฯ โทร. 0-2080-0999  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร