

แคร์พราซีน ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า Reagila (รีกิล่า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าแคร์พราซีน (cariprazine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ยานี้ห้ามใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น
 - ยาฆ่าเชื้อรา แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด
 - ยารักษาวัณโรคและโรคเอดส์บางชนิด
 - ยารักษาโรคลมชักบางชนิด
 - ยารักษาความดันโลหิตสูงบางชนิด
 - สมุนไพรหรืออาหารเสริมบางชนิด

“หากจำเป็นต้องกินยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมดังกล่าว ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้:

- หญิงมีครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรเลี่ยงการใช้ยานี้ ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคพาร์กินสัน
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคเบาหวาน
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคไขมันสูง
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ้มเลือดอุดตัน
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคลมชัก
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคไตหรือโรคตับขั้นรุนแรง
- แจ้งแพทย์ถ้าท่านใช้ยารักษาโรคหัวใจ ชื่อ “ไอ-จอก-ซิน” หรือ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชื่อ “ดา-บี-กา-แทรน”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าข้ามวันแล้วให้รอกินยาของมือต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

- ถ้าลืมกินยาเกิน 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ไปพบแพทย์

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เวียนหัว หน้ามืด หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจหรือท้องผูกผิดปกติ ยืนหรือเดินลำบาก ให้ไปโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาตรงเวลาทุกวันตามแพทย์สั่ง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ยานี้อาจทำให้ง่วง ดังนั้นเลี่ยงขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร
- ผู้ป่วยหญิงที่กินยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เป็นไข้สูงร่วมกับมีเหงื่อออก หายใจเร็ว ตัวแข็ง และง่วงนอน
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ ขาบวม ปวดและแดงอย่างไม่มีสาเหตุ
- มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- กระสับกระส่าย นิ่งนิ่งๆไม่ได้ มือสั่น ปากสั่น
- ปวดหัว นอนไม่หลับ
- มองไม่ชัด
- น้ำหนักตัวเพิ่ม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีตัวยาสาคัญ คือ แคร์พราซีน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพดและแมกนีเซียมสเตียเรท
- ยานี้มี 4 ความแรงแต่ละความแรงมีสีและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
- แคปซูลสีขาว : มีตัวยาขนาด 1.5 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “GR 1.5” บนเปลือกแคปซูล
- แคปซูลสีเขียว-ขาว : มีตัวยาขนาด 3 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “GR 3” บนเปลือกแคปซูล
- แคปซูลสีเขียว : มีตัวยาขนาด 4.5 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “GR 4.5” บนเปลือกแคปซูล
- แคปซูลสีม่วง-ขาว : มีตัวยาขนาด 6 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “GR 6” บนเปลือกแคปซูล

ผู้ผลิต: บริษัท เกดออน ริชเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ผู้นำเข้า : บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร