

## เอทอริคอกสิบ

ความแรง 30, 60, 90 และ 120 มิลลิกรัม

### ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

## ชื่อการค้า Etoricoxib Alvogen (เอทอริคอกสิบ อัลโวเจน)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib) มีตัวยา 30, 60, 90 และ 120 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเจาะจง เอนไซม์ที่ชื่อว่าคอกซ์-2

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดอาการอักเสบที่มีอาการปวดหรือบวมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบ รูห์มาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด และโรคเกาต์
- ใช้เพื่อลดอาการปวดแบบปานกลางจากการผ่าตัดช่องปากหรือการทำฟัน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือ แพ้ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือ แพ้ยาแอสไพริน
- ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง
- ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
- ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจในระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆ
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมบุตร
- อายุต่ำกว่า 16 ปี
- มีปัญหาเลือดไหลไม่หยุด หรือ โรคไขเลือดออก
- เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง
- เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

- เป็นโรคหัวใจวายรุนแรง
- มีแผลทะลุหรือเลือดออก ที่กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น หรือลำไส้ใหญ่
- ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เคยมีประวัติเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
  - เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ โรคตับ หรือ โรคไต
  - ขาดน้ำจากการอาเจียนหรือท้องเสียเป็นเวลานาน
  - เป็นโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน หรือมีภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่
  - มีอาการบวมจากการกักคั่งของน้ำในร่างกาย
  - วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
  - กำลังได้รับการรักษาภาวะติดเชื้อมากกว่า 65 ปี
- ไม่ควรใช้ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือยาแอสไพริน ขณะใช้ยานี้
- กำลังใช้ยาวาร์ฟาริน หรือยาด้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่นอยู่

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปวดแสบท้อง เจ็บแน่นหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่น่ายานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะมีอาการเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสียหายให้หัวใจและตับทำงานผิดปกติ
- ยานี้อาจทำให้เวียนหัว หรือ ง่วงนอนได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการเวียนหัว หรือ ง่วงนอน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา และไม่ใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินความจำเป็น ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องรุนแรง
  - อาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด อุจจาระสีดำ
  - หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการใจสั่น
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้องอืด แสบท้อง แสบร้อนกลางอก
- มีง่วง ปวดหัว

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### • ลักษณะยา

ยาเอทอริคอกสิบ มี 4 แบบ

• ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีเขียวแกมน้ำเงิน กลมมนูนทั้ง 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร

มีตัวยา เอทอริคอกสิบ 30 มิลลิกรัม

• ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีเขียวเข้ม กลมมนูนทั้ง 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตร

มีตัวยา เอทอริคอกสิบ 60 มิลลิกรัม

• ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว กลมมนูนทั้ง 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 มิลลิเมตร

มีตัวยาเอทอริคอกสิบ 90 มิลลิกรัม

• ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีเขียวอ่อนกลมมนูน ทั้ง 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มิลลิเมตร

มีตัวยา เอทอริคอกสิบ 120 มิลลิกรัม

**ตัวยาสำคัญ** คือ เอทอริคอกสิบ 30, 60, 90, หรือ 120 มิลลิกรัม

**ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แคลเซียมไฮโดรเจน

ฟอสเฟต [แอนไฮดรัส] ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส

โพวิโดน แมกนีเซียมสเตียเรต ครอสคาร์เมลโลส

โซเดียม (อี468) โอปาดรายด์ 2 สีเขียว

ไฮโปรมेलโลส แล็กโทสโม โมไฮเดรต ไทเทเนียมได

ออกไซด์ ไทรออะเซทิน อินดิโกคาร์มาซีน อะลูมิเนียม

ไฮดรอกไซด์

**ผู้ผลิต** Cadila Pharmaceuticals Limited,  
Gujarat – 382 225, India

**ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย**

บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>