

# โอลาพาริบ ความแรง 100, 150 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้า LYNPARZA (ลินพาร์ซา)

## 1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า โอลาพาริบ (olaparib) มีตัวยา 100 และ 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  - กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เมื่อมีอาการ
    - มีอาการหายใจไม่อึด หายใจลำบาก ไอ หรือหายใจมีเสียงหวีด ซึ่งอาจเป็นอาการของปอดอักเสบ
    - มีภาวะเลือดจาง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือเม็ดเลือดขาวต่ำ มีไข้หรือติดเชื้อ มีจ้ำเลือด หรือเลือดออก
  - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

## 3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - ยาโอลาพาริบ มีทั้งในรูปแบบเม็ดและแคปซูล ขนาดยาในการรักษาของยาเม็ดกับยาแคปซูลไม่เหมือนกัน
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- 

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบหากท่านมีกำหนดการฉีดวัคซีน หรือใช้ยาที่กดภูมิคุ้มกัน
- ผู้หญิงให้คุมกำเนิดในระหว่างที่กินยานี้ และ 1 เดือนหลังกินยามื้อสุดท้าย
- ผู้ชายให้คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยในระหว่างที่กินยานี้และ 3 เดือนหลังจากกินยามื้อสุดท้าย
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกัด
  - บัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด
  - ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวซัดหรือหัวใจเต้นเร็ว
  - จ้ำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะเวลาานานกว่าปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ปวดกล้ามเนื้อ ไม่อยากอาหาร อาหารไม่ย่อย
  - คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปยาวรี นูนทั้งสองด้าน
- ยาเม็ดความแรง 100 มิลลิกรัม มีสีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "OP 100" อีกด้านหนึ่งเรียบ
  - ยาเม็ดความแรง 150 มิลลิกรัม มีสีเขียวถึงสีเขียวเทา ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "OP 150" อีกด้านหนึ่งเรียบ
  - มีตัวยาสำคัญ คือ โอลาพาริบ (olaparib) 100 และ 150 มิลลิกรัม
  - ส่วนประกอบอื่นของเม็ดยา ได้แก่ โคโคพอลิเมอร์ ซิลิกา คอลลอยด์ลอสไตรด์ แมนนิทอล โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต
  - ส่วนประกอบอื่นของสารเคลือบเม็ดยา ได้แก่ ไฮโปรเมลโลส แมคโครกอล 400 ทีเทเนียมไดออกไซด์ ไอรอนออกไซด์เยลโลว ไอรอนออกไซด์แบล็ค (มีในยาเม็ดความแรง 150 มิลลิกรัมเท่านั้น)

- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:
- ผู้ผลิตและบรรจุ: AbbVie Ltd., Barceloneta, Puerto Rico
  - ผู้บรรจุและตรวจผ่าน: AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, United Kingdom
  - ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
  - ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2563  
คำเตือน:  
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**