

## ซิลденаฟิล ความแรง 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้า VIAGRA® (ไวอากร้า®)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซิลденаฟิล (Sildenafil) เป็นยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดด้วยการยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสชนิดที่ 5

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวร่วมกับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาลดอาการเจ็บคั่นหน้าอกในผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยากลุ่มไนเตรด) ไตแก่ ไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรด ไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรด เป็นต้น แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ⊗ ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่มไนตริกออกไซด์ไดเลตอร์ เช่น เอมีลไนเตรด
- ⊗ ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่ม กัวโนเลทไซเคิล-สติมูเลเตอร์ เช่น ริโอซิกันท์
- ⊗ ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้ยาซิลденаฟิลในการรักษา
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่มึนเมาหรือมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรง
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่เพิ่งมีอาการสมองขาดเลือดหรือมีอาการหัวใจวาย หรือมีปัญหาเรื่องความดันเลือดต่ำ
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่มีการมองเห็นหรือได้ยินผิดปกติ

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

! แจ้งแพทย์หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- เป็นโรคหัวใจ
- ความดันเลือดสูงหรือต่ำกว่าปกติ
- ผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติหรือกำลังมีแผลในกระเพาะอาหาร

- มีความผิดปกติขององคชาต
  - ! ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
  - ! ไม่ใช่ยานี้ในผู้หญิง เด็ก ผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต
  - ! เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
  - ! ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เช่น
  - ยาต้านไวรัสเอชไอวี ไตแก่ ดาร์นาเวียร์ อินดินาเวียร์ โลพินาเวียร์ เนลพินาเวียร์ ริโทนาเวียร์
  - ยาที่ใช้รักษาอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือยารักษาโรคหอยอันสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ
  - ยาลดความดันเลือดบางชนิด เช่น ยาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์
- “เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ หากไม่แน่ใจโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ **1 ชั่วโมง**
- กินยานี้ก่อนอาหารหรือกินพร้อมอาหารก็ได้
- กินยาไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

#### 3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปวดหัว หน้าแดง เวียนหัว ปวดท้อง-อาหารไม่ย่อย คัดจมูก การมองเห็นเปลี่ยนไป ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง **เพราะ**ยานี้ อาจมีผลต่อการมองเห็น
- หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าในปริมาณมากก่อนมีเพศสัมพันธ์ **เพราะ**อาจทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้น้อยลง
- หากรู้สึกว่าการผลของยาแรงหรืออ่อนไป ให้ปรึกษาแพทย์ **ห้าม**ปรับขนาดยาด้วยตนเอง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อยเป็นลม
- การมองเห็นและการได้ยินลดลง มีความผิดปกติทางสายตา
- ปวดกระดูก
- เกิดอาการชัก
- อวัยวะเพศชายแข็งค้างเกิน 4 ชั่วโมง

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- ปวดหัว เวียนหัว มึนหัว หน้ามืด ความดันเลือดต่ำ
- อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้
- หน้าแดง รู้สึกร้อนที่ใบหน้า
- คัดจมูก มีเลือดกำเดา

“หากมีอาการเหล่านี้ **ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยาและตัวยาสาคัญ: เม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนูนเคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร PFIZER อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร VGR25, VGR50 และ VGR100 ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ ซิลденаฟิล ซิเตรด 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมตามลำดับ
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ครอสคาเมลโลสโซเดียม แมกนีเซียมสเตียเรต ไฮโปรมีลโลส โทเทเนียมไดออกไซด์ แล็กโตส

**ผู้ผลิต** Fareva Amboise ประเทศฝรั่งเศส  
**บริษัท** เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด  
**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มีนาคม 2565

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**