

## เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

## ไวโนพราซาน 10, 20 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด, ไซนัมที่

### 1. ยานี้คือยาอะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร
  - ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไวโนพราซาน (vinoxiprazan) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
  - ยาที่ใช้เพื่อ [ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
  - รักษาโรคหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน
  - ป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการกินยาแอสไพรินหรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ยาไอบูโพรเฟน หรือยาไฟรอกซ์แอม
  - ใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิคอบัคทีเรีย (H.pylori)

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
  - ห้ามใช้ยาที่ ถ้าเคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา]
  - ห้ามใช้ยาที่ หากท่านกำลังกินยาคีนาซาวิร์ (Atazanavir) หรือ ยาเนฟีนาวิร์ (Nelfinavir) ซึ่งเป็นยารักษาเอช ไอ วี (HIV)
  - ห้ามใช้ยาที่ หากท่านตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาที่ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
  - ระวังการรับประทานยาคีนาซาวิร์ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี
  - ระวังการรับประทานยาคีนาซาวิร์ หากท่านมีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
  - หากคิดว่าอาจตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยาไวโนพราซาน]

### 3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
  - [ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร]
- 3.2 หากลืมกินยาคิดอย่างไร
  - [ให้กินยาทันทีที่ได้ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป]
- 3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
  - ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
  - ให้รีบไปโรงพยาบาล หรือพบแพทย์ทันที หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หายใจติดขัด กลืนลำบาก หน้าซีด มีอาการวูบที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลื่น ล้าคอ หรือสับสนอื่นของร่างกาย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- [ดื่มน้ำซึ่งมีดื่มน้ำ ไม่ควรบด หรือเคี้ยวเม็ดยา
- ควรรับประทานอย่างต่อเนื่อง ตามแพทย์สั่ง]

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
    - บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
    - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
    - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
    - [ตัวหนึ่ง หรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีสีสวาทเป็นสีน้ำตาล]
  - 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
    - [ท้องเสีย, ท้องผูก, คลื่นไส้ อาเจียน, ท้องอืด]
- ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่จำเป็นต้องแจ้งให้ไปพบแพทย์ทันที** ]

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศเย็น แสงโดยตรง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนถึงเวลากินยา เพราะยาอาจเสียได้
- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย [ผลิตโดย Takeda Pharmaceutical Company Limited., Japan นำเข้าโดย บริษัท ไทยเดด้า (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ผู้แทนจำหน่ายโดย บริษัท ดีเดเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย] เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561]

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร