

เอทอริคอกสิบ 60, 90 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า ARTHOXIB (อาร์โทซิบ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อาร์โทซิบ มีตัวยา เอทอริคอกสิบ 60 หรือ 90 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- บรรเทาอาการปวดและบวมของข้อต่อและกล้ามเนื้อจากโรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อกระดูกสันหลังอักเสบและโรคเกาต์
- บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางภายหลังการผ่าตัดที่ช่องปาก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือแอสไพริน
- ⊗ มีแผลหรือเลือดออกของทางเดินอาหาร
- ⊗ มีปัญหาโรคหัวใจ
- ⊗ มีความดันเลือดสูง
- ⊗ มีตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- ⊗ มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
- ⊗ หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
- ⊗ เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของทางเดินอาหาร เช่น โรคโครห์น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีประวัติความดันเลือดสูง ไชมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน สูบบุหรี่
 - มีประวัติ แผลในทางเดินอาหาร
 - มีประวัติเป็นโรคตับ ไต หัวใจ

- กำลังใช้ยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นๆร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ หากท่านไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- อยู่ในภาวะขาดน้ำ เช่น อาเจียนหรือท้องเสียเป็นระยะเวลานาน
- ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาภายใน 12 ชั่วโมง ให้กินทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยามื้อถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจไม่อึด เจ็บหน้าอก
- ปวดท้องรุนแรง เลือดออกในทางเดินอาหาร อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดําเข้มผิดปกติ

- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องร่วง แสบยอดอก
- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดันเลือดสูง ใจสั่น นอนไม่หลับ ผื่น แผลเปื่อยในช่องปาก
- บวมที่ขาหรือเท้า

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา :** เม็ดรูปสามเหลี่ยมมน เคลือบฟิล์ม มีทั้งหมด 2 ความแรง
 - ความแรง 60 มิลลิกรัม เคลือบฟิล์มสีเขียว ด้านหนึ่งมีอักษร 60 อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - ความแรง 90 มิลลิกรัม เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร 90 อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสำคัญ :** เอทอริคอกสิบ
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** แอนไฮดริส ไดเบสิกแคลเซียม ฟอสเฟต, คลอสคาร์เมลลอสโซเดียม, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส พีเอช 102, แมกนีเซียม สเตียเรท, โอปาตราย กรีน, โอปาตรายไวท์

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผลิต: บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด

1/18 หมู่ 4 แขวงบึงคำพร้อย

อำเภอสามโก้ จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2157-1111 แฟกซ์ 0-2943-5038

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th/>