

297 mm

ترامาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 37.5 มิลลิกรัม
และพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า TRAMACET (ترامาเซท)

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

คำเตือนสำหรับ ترامาดอล

- ترامาดอล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดยาใช้ยาในทางที่ผิด หรือใช้ยาผิดวิธี และอาจนำไปสู่การใช้ยาเกินขนาด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดระบบการหายใจและตายได้
- ห้ามใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนดับวายเสียชีวิตได้

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้เป็นสูตรผสมของยาชื่อว่า ترامา-ดอล (tramadol) และพา-รา-เซ-ตา-มอล (paracetamol) เป็นยากลุ่มบรรเทาปวด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันและรุนแรงที่รักษาอาการปวดด้วยยาอื่นไม่เพียงพอ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยา ترامาดอล ยาพาราเซตามอล หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดทอนซิลหรือต่อมอดีนอยด์และอายุน้อยกว่า 18 ปี
- มีอาการทางเดินหายใจถูกกดอย่างรุนแรง หรือมีอาการหืดรุนแรงหรือเฉียบพลัน
- เป็นโรคตับรุนแรง
- มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือภาวะลำไส้อุดตันไม่ทำงาน
- เป็นโรคลมชัก เพราะยานี้เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการชักเพิ่มได้
- มีภาวะสุราเป็นพิษ
- กำลังใช้ยานอนหลับ ยาลดปวด หรือยาที่มีผลต่ออารมณ์
- กำลังใช้ยาสำหรับภาวะซึมเศร้ากลุ่มเอมเอไอโอ (MAOIs) หรือเคยใช้ยากลุ่มนี้ในช่วง 14 วันก่อนหน้า

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- มีภาวะพร่องจี-ซิกซ์ -พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
 - ดื่มสุราเป็นประจำ เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
 - หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก
 - ผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปี ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ เพราะยาอาจกดการหายใจ
 - เป็นโรคไต โรคไทรอยด์
 - มีปัญหาในการบัสสาวะ
 - มีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนหรือถุงน้ำดีหรือเคยเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดี
 - มีความดันเลือดต่ำรุนแรง
 - เคยได้รับบาดเจ็บที่หัว ข้อศอก ปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียน
 - กำลังใช้ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ อยู่
 - การใช้ยาในระยะยาวอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ หรือมีการทำงานของต่อมหมวกไตบกพร่อง

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดความรุนแรงของอาการปวด
- ไม่ควรกินยามากกว่าวันละ 8 เม็ด เว้นแต่แพทย์สั่ง
- ผู้ป่วยโรคไตบกพร่องรุนแรง กินครั้งละ 2 เม็ด แต่กินซ้ำไม่เกินทุก 12 ชั่วโมง
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

ถ้าลืมหากินยาแล้วยังมีอาการปวดอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

รีบไปพบแพทย์ทันทีหากได้รับยาเกินขนาด แม้จะไม่มีอาการผิดปกติ เพราะผลเสียต่อร่างกาย อาจเกิดช้าและได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย หมดสตินำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากต้องกินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- อย่าปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง เพราะอาจจะมีอาการถอนยารุนแรง (ได้แก่ อาการกระสับกระส่าย มือสั่น นอนไม่หลับ และไม่สบายท้อง)
- ไม่ใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีส่วนผสมของ ترامาดอลหรือพาราเซตามอล
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เพิ่มอาการง่วงจากยา ترامาดอล
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน

- ไม่แนะนำให้ผู้อื่นใช้ยานี้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา และริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- เพื่อ เห็นภาพหลอน ผื่นร้าย มีเสียงดังในหู หมดสติ
- หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว

"เป็นอาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ปัสสาวะสีเข้มขึ้น ปัสสาวะขัด
- เบื่ออาหาร ปากแห้ง
- ค้น เหนือออกมา
- วิงเวียน ง่วง นอนไม่หลับ สับสน กระวนกระวาย หลงลืม อารมณ์แปรปรวน
- รู้สึกหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นนั่งหรือยืน หัวใจเต้นช้าลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปวดหัว ร้อนวูบวาบ
- ดิทยา ไม่สามารถหยุดกินยาได้

"เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ห้ามเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

297 mm

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : เม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลือง เรียบทั้งสองด้าน

ตัวยาสําคัญ : ทรามาโดล ไฮโดรคลอไรด์ และ พาราเซตามอล


ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด, ไมโคร - คริสตัลไลน์เซลลูโลส , ฟรีเจลาตินโซสตาเรท, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต, แมกนีเซียม สเตียเรท, โอปาตราย® เยลโลว์ และน้ำ

ผู้ผลิต: บริษัท ฟอนด์ เคมีคอล จำกัด
1/18 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2157-1111
แฟกซ์ 0-2943-5038

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท มาซา แล็บ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10150, ประเทศไทย
โทร. 0-2971-6299
E-mail address : info@masalab.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ :
6 มิถุนายน 2568

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR2A1052671509211C> หรือ



เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร