

เอมไตรซิทาบิน และ ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟีนาไมด์
200 มิลลิกรัม/ 10 มิลลิกรัม
200 มิลลิกรัม/ 25 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า : เดสโควี(Descovy®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เอมไตรซิทาบิน (Emtricitabine) และ ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟีนาไมด์ (Tenofovir alafenamide) เป็นยาในกลุ่ม ยาด้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี สายพันธุ์ 1 (HIV-1) ในผู้ป่วยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัว 35 กิโลกรัมขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีหรือน้ำหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
- โรคตับหรือตับอักเสบ
ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของโรคตับ

- และห้ามหยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- เนื่องจากอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น
- โรคติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี
เพื่อแพทย์จะวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและลดอันตรายจากยา
- **แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**

- วางแผนตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ เรื่องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
- กำลังตั้งครรภ์
เนื่องจากแพทย์อาจสั่งตรวจประเมินพัฒนาการของทารกสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตามมีการประเมินเด็กที่ได้รับยานี้ระหว่างตั้งครรภ์พบว่า
ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง

- กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม
• **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้**
เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น

- ยาด้านวัณโรคบางชนิด
 - ยาด้านไวรัสตับอักเสบบีบางชนิด
 - ยาด้านไวรัสเอดส์บางชนิด
 - ยาแก้ปวดบางชนิดสมุนไพรบางชนิด
 - ยาด้านไวรัสตับอักเสบบีบางชนิดที่มีส่วนประกอบของ ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟีนาไมด์ หรือ ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท หรือลามิวูดีน หรือ อะดีโฟเวียร์ ไดไฟโวซิล
- หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวอยู่หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้
ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาวันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร ห้ามเคี้ยว หัก หรือแบ่งเม็ดยา
- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง และเมื่อยาใกล้หมดควรรีบพบแพทย์เพื่อรับยาต่อเนื่อง มิเช่นนั้น การขาดยาอาจทำให้อาการของโรคกำเริบและรักษายากขึ้น
- หากอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยา ให้กินอาหารและกินยาใหม่ หากอาการอาเจียนเกิดหลังจาก 1 ชั่วโมง ที่กินยาไม่ต้องกินยาซ้ำ

- หากคุณต้องฟอกไต ให้กินยาหลังฟอกไต

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้านึกออกภายใน 18 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 18 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแสบหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ท่านไม่ได้ให้แจ้งแพทย์

- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง
เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- อย่าให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้เพราะยาถูกขับทาง
น้่านม
- ในระหว่างใช้ยา
ต้องป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น
โดยสวมถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ไม่บริจาคเลือด
ไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น มีดโกน
แปรงสีฟันหรือของใช้ที่มีเลือดติดอยู่ เป็นต้น
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์
หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
เนื่องจากยานี้อาจทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีน้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือและเท้าอ่อนแรง ลุกจุกไปทั้งตัว ใจสั่น มือสั่นผิดปกติ
- ข้อตึงขัด ปวดเจ็บข้อโดยเฉพาะสะโพก หัวเข่า และไหล่ เคลื่อนไหวลำบาก
- อาการอักเสบหรือติดเชื้อ

"ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องอืด
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ผื่นผิดปกติ ลมพิษ

"ให้รอดอาการ"

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ "

หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ
ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยานี้

โปรดแจ้งแพทย์และผู้รับผิดชอบการ

วางจำหน่ายในประเทศ

(หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-3500)

เพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30

องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น
ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา :

เดสโควี (200 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม) :

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเทา

ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "GSI" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "210"

เดสโควี (200 มิลลิกรัม/25 มิลลิกรัม) :

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเทา

ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "GSI" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "225"

ส่วนประกอบของยา :

เดสโควี (200 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม) :

ตัวยาออกฤทธิ์ : เอมไตรซิทาบิน 200 มิลลิกรัม และ

ทีโนโฟเวียร์อะลาพินาไมด์ 10 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่น : ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส

ครอสคาร์เมลโลส แมกนีเซียมสเตียเรต

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ไททาเนียมไดออกไซด์

แมโครกอล 3350 ทัลก์ ไอเออร์น ออกไซด์สีดำ

เดสโควี (200 มิลลิกรัม/25 มิลลิกรัม) :

ตัวยาออกฤทธิ์: เอมไตรซิทาบิน 200 มิลลิกรัม

และทีโนโฟเวียร์อะลาพินาไมด์ 25 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่น : ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส

ครอสคาร์เมลโลส แมกนีเซียมสเตียเรต

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ไททาเนียมไดออกไซด์

แมโครกอล 3350 ทัลก์ สีแดงอินดิโกคาร์มิน

ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย DCH Auriga (Thailand) Limited

เจ้าของผลิตภัณฑ์ Gilead Sciences Inc., USA

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**