

ลูบิพรอสโตน  
8, 24 ไมโครกรัม  
ชนิดแคปซูลนิ่ม  
Amitiza (อามิทิซา)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลูบิพรอสโตน (Lubiprostone) เป็นยาในกลุ่มยาระบาย

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ชนิดสี่ชมพูขนาด 8 ไมโครกรัม ใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวน ชนิดท้องผูกเด่นในสตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ชนิดสี่ส้มขนาด 24 ไมโครกรัม ใช้รักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง ในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือสงสัยว่าอุดตัน

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากท่านมีอาการท้องเสียรุนแรง แขนงน้ำตาลบางชนิด ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะแพทย์ต้องวินิจฉัยสาเหตุของโรคเพื่อกำหนดขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา

- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยว บดหรือเปิดแคปซูล
- กินยาพร้อมอาหารและดื่มน้ำตามเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่เกิดจากยานี้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องกินยามื้อที่ลืม ให้รอกินมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันที ถ้าทำได้ให้น้ำยานี้ติดตัวไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากใช้ยานี้แล้วปวดท้องมาก ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจภาวะอุดตันที่ทางเดินอาหาร
- แจ้งแพทย์หากมีอาการคลื่นไส้รุนแรงเมื่อใช้ยานี้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิวดกตี
- ท้องเสียรุนแรง
- วูบหรือความดันเลือดต่ำเมื่อกินยาครั้งแรกหรือหลังกินยาแล้วหลายครั้ง
- หายใจลำบากภายใน 1 ชั่วโมงที่กินยาครั้งแรก ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 3 ชั่วโมง และอาจเกิดซ้ำเมื่อกินยาครั้งต่อไป

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง ท้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แกะยาออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยานี้เป็นยาแคปซูลนิ่มรูปร่างยาวรี ด้านหนึ่ง มีตัวอักษร “SPI” พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ อีกด้านหนึ่งเรียบ

ยานี้มีสองขนาดความแรง

**ชนิดสี่ชมพู** ประกอบด้วยตัวยาลูบิพรอสโตน 8 ไมโครกรัม

**ชนิดสี่ส้ม** ประกอบด้วยตัวยาลูบิพรอสโตน 24 ไมโครกรัม

**ส่วนประกอบของยานี้**

มีเดียมเซนไตรกลีเซอไรด์

**ส่วนประกอบของเจลาตินแคปซูล**

เจลาติน สารละลายซอร์บิทอลซอร์บิเทน

โทเทเนียมไดออกไซด์ (อี171) เฟอริกออกไซด์ (อี172)

หมึกโอพาคีต ดับบีวี บี แบลค สำหรับยาแคปซูล 8 ไมโครกรัม

เอฟที แอนด์ ซี เร็ด เบอร์ 40 (อี129) ดี แอนด์ ซี เบลโล่ เบอร์ 10

หมึกโอพาคีต ดับบีวี บี แบลค สำหรับยาแคปซูล 24 ไมโครกรัม

ผู้ผลิต: Catalent Pharma Solutions, LLC, USA

ผู้นำเข้า: บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย)จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เมษายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

