

ดาโคมิทินิบ

ความแรง 15 , 30 และ 45 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า VIZIMPRO (วิ-ซิม-โปร)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ดาโคมิทินิบ (dacomitinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีความผิดปกติของปอด หรือการหายใจ เช่น หายใจลำบาก หายใจไม่อิ่ม ไอแบบมีเสมหะ หรือไม่มีเสมหะ มีไข้
 - แพ้น้ำตาลนม (แลคโตส) เนื่องจากตัวยามีส่วนผสมของแลคโตส
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- กำลังตั้งท้องหรือวางแผนที่จะมีลูก
- กำลังให้นมลูก
- เป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด
- กำลังใช้ยากลุ่มต่อไปนี้
 - ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - ยารักษาโรคจิตหรือจิตเภท
 - ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- กินยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายจากยา
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดในระหว่างได้รับยาและคุมต่อไปหลังหยุดยาอีกอย่างน้อย 17 วัน
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกในขณะที่ใช้ยานี้และต่อเนื่องอีก 17 วันหลังหยุดยา
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย และระคายเคืองตา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนิ่ง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจลำบาก หายใจไม่ออก อาจมีอาการไอ หรือมีไข้ร่วมด้วย
- ท้องเสียรุนแรง ปากแห้ง คอแห้ง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผม่ว้ง ผิวแห้ง คันผิวนิ่ง ผิวลอก

- ไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด
- ช่องปากอักเสบ
- ตาแห้ง แดง หรือคันตา
- คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นเม็ดสีฟ้า รูปร่างกลมมนทั้งสองด้าน
- ตัวยาสำคัญ ดาโคมิทินิบ
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่

แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรต, โกลโคเลต, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า: บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มกราคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร