

1.3.1.3 Package  
ชื่อการค้า Mydria mac (มายเดรีย แมค)

## ยาหยอดตา โทรพิคาไมด์ และ เฟนิลเอเฟริน

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า "มายเดรีย แมค" มีตัวยา โทรพิคาไมด์ (tropicamide) ความแรง 0.8% ผสมกับ เฟนิลเอเฟริน (phenylephrine) ความแรง 5%

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อขยายม่านตาก่อนการตรวจหรือผ่าตัดตา

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ผื่นหลอดเลือดแดงโป่งพอง
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูง
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต่อหีนชนิดมุมปิด
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้กำลังใส่คอนแทคเลนส์
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่มลดความดันเลือด ยา รักษาโรคซึมเศร้าบางกลุ่ม หากท่านไม่แน่ใจว่า กำลังใช้ยาได้อยู่ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
- แจ้งแพทย์หากมีความดันในลูกตาสูง
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคหอบหืด
- แจ้งแพทย์หากมีอาการตาแดง หรือตาอักเสบ
- ผู้สูงอายุและเด็กควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังให้นมลูก เพราะยังไม่มีข้อมูล ยืนยันความปลอดภัย
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาอื่นอยู่ เช่น ยาแก้แพ้ ยาจิตเภท ยาดีจ็อกซิน เบลลาดอนนาแอลคาลอยด์ เป็นต้น **เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 วิธีใช้ยา

- การใช้ยาจะเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ที่หยอดยานี้ให้กับท่าน 1-2 หยด ก่อนตรวจตา ก่อนส่องกล้อง หรือ ก่อนผ่าตัดตาเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที
- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดยา
- ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยอดยาเป็นเวลา 15 นาที
- ให้กดหัวตานาน 2 นาทีหลังจากหยอดตา เพื่อลดผลข้างเคียงของยาต่อร่างกาย
- หากมียาหยอดตา หรือยาป้ายตาชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะห่างจากยาอื่น ๆ อย่างน้อย 5 นาที ก่อนใช้หยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นต่อไป

#### 3.2 หากได้รับยาหยอดตาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าใช้ยาหยอดตามากเกินไป ให้รีบแจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยานี้มีผลต่อการมองเห็น งดการขับขีรถทุกชนิด และงดกิจกรรมทุกชนิดที่ต้องใช้สายตา จนกว่าการมองเห็นจะเป็นปกติ

### 5. อันตรายที่เกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้อง รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ชัก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- เจ็บหน้าอกร่วมกับปวดคอและหลัง หายใจลำบาก เหนื่อยออกผิดปกติ
- ปวดศีรษะเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง
- ปวดลูกตา ตาแดง
- มีอาการเป็นลม หมดสติ

"หากมีอาการข้างต้น รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที"

#### 5.2 อาการที่ ไม่จำเป็นต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาล แต่มีอาการรุนแรงให้รีบแจ้งทันที

- เวียนศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย
- ปากแห้ง
- ตะคริว
- ตาไม่สู้แสง เปลือกตาบวมแดง คันเปลือกตา

"ให้รอดูอาการ แต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล"

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะภายนอกบรรจุยา :** ขวดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สีขาว ฝาพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง (HIPS) สีชมพูคาราเมล มีเดือยสำหรับเจาะ ขวดละ 5 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสำคัญ ได้แก่**
  - โทรพิกาไมด์ (tropicamide) ความแรง 0.8% และ
  - เฟนิลเอพรีน (phenylephrine) ความแรง 5%
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่**
  - คลอบูทอล
  - โซเดียมไนเตรด
  - โซเดียมเมทาไบซัลเฟต
  - ไดโซเดียมเอเดเทต
  - ไดออกซิลโซเดียมซัลโฟซึกซิเนต
  - กลีเซอริน
  - ไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส
  - โพลีไวนิลไพโรลิโดน
  - พอลิซอร์เบต 80
  - กรดไนตริก
  - โซเดียมไฮดรอกไซด์
  - น้ำ

### ชื่อผู้ผลิต

Micro Lab Ltd. ประเทศอินเดีย

### ชื่อผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
เลขที่ 640/53-54 ซอยเพชรบุรี 22 ถนนเพชรบุรี แขวง  
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
10400 โทรศัพท์ 0 2656 6670-4

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร