

อีบาสทีน
ความแรง 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า เคสติน (Kestine)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า อีบาสทีน (ebastine)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ ได้แก่ อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง เจ็บตา
 - ยานี้ใช้รักษาอาการผื่นลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ ห้ามใช้หากแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - โรคหัวใจ
 - โรคตับ
 - ผู้หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย
 - อายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย
 - แพ้น้ำตาลนม
 - กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น คีโทโคนาโซล อีทราโคนาโซล ฟลูโคนาโซล อิริโทรมัยซิน ไรแฟมปีซิน เป็นต้น เพราะอาจส่งผลต่อการรักษา
- “หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือกินยาโดยอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือตอนท้องว่าง
 - ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้ง ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไป ให้รอกินยาของมื้อถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากกินยาแล้วมีอาการง่วงซึม ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก กลืนลำบาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
 - ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง
- “ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- ปวดศีรษะ ง่วงซึม ปากแห้ง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาเม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีขาว มี 2 ความแรง **ความแรง 10 มิลลิกรัม** ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์สัญลักษณ์ E/10 **ความแรง 20 มิลลิกรัม** ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์สัญลักษณ์ E/20
- ตัวยาสำคัญ** อีบาสทีน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส (microcrystalline cellulose), สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์ (starch pregelatinized), แล็กโทสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate), ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium), แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate), ไฮโปรมेलโลส (hypromellose), มาโครกอล 6000 (macrogol 6000), ไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide)

ผู้ผลิต Industrias Farmaceuticas ALMIRALL, S.A. ประเทศสเปน
ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 8-9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx
- http://ndi.fda.moph.go.th/

**คำเตือนในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 28**

1. ยานี้อาจทำให้วังงซึม จึงไม่ควรขับขีเยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3. ระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรกและสตรีที่ให้นมบุตร
4. หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดและปรึกษาแพทย์
5. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ
6. การใช้ยานี้ร่วมกับยาด้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin หรือยาด้านเชื้อรา กลุ่ม Imidazole เช่น ketoconazole, itraconazole, fluconazole, หรือยากกลุ่ม HIV Protease Inhibitors รวมทั้งยาอื่นที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP450 เช่น cimetidine, metronidazole, zafirlukast, ยากลุ่ม SSRIs เป็นต้น จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้นเป็น 2-3 เท่า และมีรายงานการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้
7. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT interval ยาวขึ้น เช่น Calcium channel blockers (เช่น bepridil, verapamil), Tricyclic antidepressant, cisapride, quinidine เป็นต้น