

ไรวารีอกซาแมน  
ความแรง 10 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ชื่อการค้า RIVAXORED®  
(ไรวาชอเรด)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไรวารีอกซาแมน เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า
- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำที่ขา และภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด และป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังมีเลือดออกมากผิดปกติ
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหรือภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกอย่างรุนแรง (เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, อาการบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง, เพิ่งผ่าตัดสมองหรือดวงตาเมื่อไม่นานมานี้)
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาอื่นเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ วาร์ฟาริน ดาบิกาเทรน เอพิซาแมน หรือเฮพาริน
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งท้องหรือวางแผนที่จะมีลูก
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังให้นมลูก

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีได้ในกรณีต่อไปนี้
    - ภาวะไตทำงานบกพร่องปานกลางและรุนแรง
    - มีความดันเลือดสูงขั้นรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้
    - มีแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เมื่อเร็วๆ นี้
  - ใส่ลิ่มหัวใจเทียม
  - มีความดันเลือดไม่คงที่หรือมีกำลังจะผ่าตัดเพื่อเอาลิ่มเลือดออกจากปอด
  - มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นสาเหตุให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือด
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้  
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

### 3.2 หากลืมนกินยานี้ ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปในวันถัดไปตามที่กำหนด ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในระหว่างได้รับยา
- ระวังการขับรถหรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วิงเวียนหรือเป็นลมได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดหัว อาเจียน ชัก หมดสติ หรือคอแข็ง
- เลือดออกมากหรือนานผิดปกติ เช่น เลือดออกในตา เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก ไขมีเลือดปน ปัสสาวะมีเลือดออก ประจำเดือนมากผิดปกติ
- อ่อนแรง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ บวมโดยไม่มีสาเหตุ หายใจหอบ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวหนังช้ำ
- รู้สึกไม่สบาย มีไข้
- ปวดแขนขา
- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** เป็นเม็ดสี่เหลี่ยม รูปร่างกลมมนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวเลข 10
- **ตัวยาสําคัญ:** ไรวาร็อกซาแบน 10 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ**  
ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส แลคโตสโมโนไฮเดรต  
ครอสคาเมลโลสโซเดียม ไฮโปรมะลโลส  
โซเดียมลอริลซัลเฟต แมกนีเซียมสเตียเรต

**ผู้ผลิต:** บริษัท ด็อกเตอร์เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์  
จำกัด ประเทศอินเดีย

**ผู้นำเข้า:** บริษัท ด็อกเตอร์เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์  
(ประเทศไทย) จำกัด

**ผู้แทนจำหน่าย:** บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2564

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**