

**เออร์โลทินิบ**  
**ความแรง 100 และ 150 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า Alvoceva**  
**(อัลโวเควาร)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เออร์โลทินิบ (Erlotinib) มีตัวยา 100, 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กตามแพทย์สั่ง
- ยานี้ใช้ร่วมกับยาเจมไซทาบินในการรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจาย

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- แพ้น้ำตาลแลคโทส
- กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก หรือวางแผนจะตั้งท้องก่อนทำการรักษาหรือใช้ยานี้
- กำลังใช้ยาต่อไปนี้ ได้แก่ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อักเสบ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาควบคุมไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตราย
- ใส่คอนแทคเลนส์หรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามาก่อน เช่น ตาแห้ง กระจกตาอักเสบ หรือแผลในตา

**คำเตือน:** ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น **เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค**
- กินยานี้วันละ 1 ครั้งโดยกินก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังกินอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง

#### 3.2 หากลืม กิน ยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ไอ มีไข้ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากคุณตั้งท้องในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ ปวดท้องรุนแรง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะมีสีเข้ม
- บัสสาวะน้อย หรือบัสสาวะไม่ออก
- ตาแดงผิดปกติ หรือเจ็บในตา
- หายใจลำบากร่วมกับอาการไอหรือมีไข้
- มีอาการชา เดี๋ยวเซ ตาพร่า
- มีจุดแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  - น้ำตาไหลผิดปกติ ตาพร่า ตาไม่สู้แสง มีแผลในปาก หรือที่ริมฝีปาก
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น แดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

**อัลโวเควาร 100 มิลลิกรัม** เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มกลมมนทั้งสองด้านสีขาวค่อนข้างเหลือง มีเลข 100 ที่ข้างหนึ่งของเม็ดยา

**อัลโวเควาร 150 มิลลิกรัม** เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มกลมมนทั้งสองด้านสีขาวค่อนข้างเหลือง มีเลข 150 ที่ข้างหนึ่งของเม็ดยา

**ส่วนประกอบของยานี้:**

ตัวยาสำคัญ คือ เออร์โลทินิบ ไฮโดรคลอไรด์ ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ แลคโทสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสทาลลิน เซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรทไฮโดรเจนซัลเฟต, โอลิโกแซคคาไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์

ผลิตโดย Remedica LTD., Cyprus

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**