

ซาฟินาไมด์
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Equifina® 50 mg
FILM COATED TABLETS
(เอคูฟิโน 50 มก.)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซาฟินาไมด์ (safinamide) เป็นยาในกลุ่มต้านโรคพาร์กินสัน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดสบี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยใช้เสริมกับการรักษาด้วยยาลีโดพาที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X กำลังใช้ยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดสเหมือนกับยานี้
- X กำลังใช้ยาเพทิดีน
- X เป็นโรคตับระยะรุนแรง
- X โรคผิวหนัง · จอประสาทตาเสื่อม · ม่านตาอักเสบ · ความผิดปกติของจอตาทางกรรมพันธุ์ · โรคจอตาเสื่อมจากเบาหวานชนิดรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร** ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคตับ
 - เป็นหรือมีประวัติเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจอตา
 - ขาดความยับยั้งชั่งใจ
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมลูก
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี
 - กำลังใช้ยาแก้ไอชื่อว่า เดกซ์โทรมิเตอร์แฟน · ยาในกลุ่มรักษาโรคซึมเศร้าบางชนิด

“หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วรอกินยาในวันถัดไปตามขนาดเดิม

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัวหรือง่วงซึม
- ผู้หญิงที่กินยานี้ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งท้อง
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในระหว่างให้นมลูก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาพร่า ปวดตา ปวดหัวรุนแรง
- วิตกกังวลกระสับกระส่ายตื่นเต้น ร่วมกับ สับสน มีไข้ กล้ามเนื้อกระตุกรัว เหงื่อแตก หัวใจเต้นเร็ว

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาการง่วงซึม อยู่ไม่นิ่ง นอนไม่หลับ
 - ต้อกระจก
 - ความคุมตนเองหรือยับยั้งชั่งใจไม่ได้
 - คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เวียนหัว มึนงง ง่วงซึม
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม นูนทั้งสองด้าน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร E284
- **ตัวยาสําคัญ** ซาฟินาไมด์เมซิโลด
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ lactose hydrate (แลคโทสไฮเดรต), corn starch (คอร์นสตาร์ช), sodium starch glycolate (โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต), hydroxypropylcellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส), light anhydrous silicic acid (ไลต์แอนไฮไดรอสซิลิกแอซิด), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต), hypromellose (ไฮโพรเมลโลส), D-mannitol (ดี-แมนนิทอล), macrogol 6000 (มาโครกอล 6000), talc (ทัลค), carnauba wax (คาร์นูบาแวกซ์)

ผู้ผลิต Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Odawara Plant, Japan

ผู้นำเข้า บริษัท เอไอ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท เอไอ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>