

Sequence Package Leaflet - Thai

ลินาไลโดไมด์

ความแรง 5, 10, 15 และ 25 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Leavdo (ลีวีโด)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร
• ยานี้มีชื่อว่า ลินาไลโดไมด์ (Lenalidomide) มีตัวยา 5, 10, 15 และ 25 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มกดภูมิคุ้มกัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคดังต่อไปนี้

- โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลไมอีโลมา
- โรคไขกระดูกเสื่อม
- โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเซลล์แมนเทิล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มทาลิโดไมด์
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก **เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก**
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงให้นมลูก เนื่องจากยาอาจผ่านน้ำนมสู่เด็กและเกิดอันตรายได้
- ⊗ ห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจวัดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด ในเดือนแรกและหลังจากเริ่มรับประทานยาได้ 3 เดือน และควรตรวจวัดทุก 3 เดือน อย่างสม่ำเสมอ
- ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบชนิดบี
- ผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปี หรือเป็นโรคไต
- ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ชายที่ได้รับยานี้ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้องใช้ต่อไปอีก 1 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
 - ต้องได้รับการตรวจการตั้งครรภ์จากแพทย์ดังนี้
 - ก่อนการรักษา
 - ทุก 4 สัปดาห์ระหว่างการรักษา
 - 4 สัปดาห์หลังหยุดการรักษา
- หากประจำเดือนผิดปกติ หรือประจำเดือนขาด ต้องตรวจการตั้งครรภ์และปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีแผลในปาก หรืออาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ
- มีอาการเหน็บชา เจ็บตามมือและเท้า
- ปวดเท้าหรือเท้าบวมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน่อง

- ปวดหน้าอกลามมาที่แขน คอ กราม หลัง หรือท้อง
- มีเหงื่อออกและหายใจลำบาก รู้สึกไม่สบาย อาเจียน
- มองเห็นไม่ชัด หรือพูดลำบาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ท้องอืด
- ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
- ง่วงซึม วิงเวียน หรือนอนไม่หลับ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลีฟโด 5 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาว
ลีฟโด 10 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาว-เขียว
ลีฟโด 15 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีขาว-เทา
ลีฟโด 25 มิลลิกรัม เป็นแคปซูลสีเหลือง

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่
แลคโตสแอนไฮดรัส ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส icroสคาร์เมลโลสโซเดียม แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต TTY Biopharm Co., Ltd. Chungli Factory, 838, Chung Hwa Rd., Sec. 1., Chungli Dist., Taoyuan City., 32069, Taiwan R.O.C.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย
บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร