

**เดกเตรน 70, ไฮโปรมेलโลส**  
**ความแรง 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร,**  
**3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**  
**ชนิดสารละลายสำหรับหยอดตา**  
**ชื่อการค้า TRANCELTEAR**  
**(ทรานเซลเทียร์)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อว่าเดกเตรน 70 (dextran 70) มีตัวยา 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ ไฮโปรมेलโลส (hypromellose) มีตัวยา 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันบูด

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการตาแห้ง และรักษาอาการระคายเคืองตา

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - อยู่ในระยะให้นมลูก
  - กำลังใช้ยาหยอดตาอื่นอยู่

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียว เมื่อใช้แล้วต้องทิ้ง ไม่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ออก
- วิธีใช้ยา
  - ☞ ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
  - ☞ ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้

- อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
  - อย่าใช้ยานี้ถ้าน้ำยามีสี หรือขุ่น
3. หักปลายหลอดเพื่อเปิดใช้
  4. เมื่อเปิดแล้วให้หยอดยาทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  5. ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือสิ่งอื่น
  6. หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด ตามที่ต้องการ

### 3.2 หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการ ให้หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้หรือตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ล้างตาด้วยน้ำอุ่น

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- งดการขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา จนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ปกติ
- เพราะยานี้ อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยาแล้วอาการตาแห้งไม่ดีขึ้นหรืออาการแยลง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ปวดหัว กลัวแสง ความรู้สึกที่ตาลดลง เส้นเลือดที่เยื่อตาบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ตาแห้ง ระคายเคืองตา คันตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในตา
- มีขี้ตา น้ำตาไหลมาก มองเห็นภาพไม่ชัด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- เปิดใช้เกิน 12 ชั่วโมงแล้วใช้ไม่หมดให้ทิ้ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา** หลอดพลาสติกละ 0.3 มิลลิลิตร และ 0.8 มิลลิลิตร

ภายในบรรจุน้ำยาปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี

- **ตัวยาสำคัญ** เดกเตรน 70 และ ไฮโปรมेलโลส
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, โซเดียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์, แมกนีเซียมคลอไรด์, แคลเซียมคลอไรด์, สารละลายกรดไฮโดรคลอริก, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับยาฉีด

### ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด  
 174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลพางาม  
 อำเภอเวียงชัย  
 จังหวัดเชียงราย 57210  
 Call center 0 2945 9555

### เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

14 กันยายน 2565

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

### เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร