

เวโดลิซูแมบ

300 มิลลิกรัม

ชนิดยาผงที่ต้องละลายสำหรับฉีดแบบหยดเข้า

หลอดเลือดดำ

ENTYVIO (เอนทิวีโอ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เวโดลิซูแมบ (vedolizumab)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโครห์นระดับปานกลางถึงรุนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้เมื่อมีอาการติดเชื้อรุนแรง เช่น ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในระบบประสาท

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร เนื่องจากยานี้อาจผ่านเข้าสู่น้ำนมได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

“ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

3.2 หากลืมนำยาควรทำอย่างไร

- ถ้าเกิดลืมนำยาตามนัด ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำนัดหมายรับยาครั้งถัดไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หลังจากฉีดยาให้ระมัดระวังการขับขี้นานพาทะ ทำงานกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หากจำเป็นต้องฉีดวัคซีน ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกร ว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
- ให้รีบแจ้งแพทย์ หากใช้ยานี้เกิน 14 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มองเห็นไม่ชัด สูญเสียการมองเห็น พูดลำบาก แขนหรือขาอ่อนแรง การเดินผิดปกติหรือมีปัญหาการทรงตัว มีอาการชาเป็นเวลานาน ความรู้สึกรับรสลดลง หรือสูญเสียการรับรส สูญเสียความทรงจำชั่วคราว หรือสับสน
- มีการติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง อาการไอ หนาวสั่น ไออย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- อาการหวัด
 - ปวดศีรษะ
 - ปวดตามข้อ
 - มีอาการระคายเคือง หรือเจ็บบริเวณตำแหน่งที่ให้ยา
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้าทนไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยากลับบ้าน อย่าแกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- เก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

ผงยา สีขาวถึงเกือบขาว

ส่วนประกอบของยานี้

แอล-ฮีสติดีน แอล-ฮีสติดีนโมโนไฮเดรต

แอล-อาร์จินีนไฮโดรคลอไรด์ ซูโครส โพลีซอร์เบต 80

น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ไนโตรเจน

ผลิตโดย Hospira Inc., United State of America

นำเข้าโดย บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด,

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มีนาคม 2562